

Рандомизация и разреженность в задачах huge-scale оптимизации на примере работы метода зеркального спуска

Аникин А.С. (ИДСТУ СО РАН)

Гасников А.В. (ИППИ РАН; ПреМоЛаб МФТИ)

Горнов А.Ю. (ИДСТУ СО РАН)

Аннотация

В работе исследуются различные рандомизации метода зеркального спуска для задач huge-scale оптимизации с разреженной структурой. В качестве одного из примеров приложения приводится задача PageRank.

Ключевые слова: huge-scale оптимизация, рандомизация, метод зеркального спуска, разреженность, оценки вероятностей больших уклонений, PageRank.

1. Введение

В недавнем цикле работ Ю.Е. Нестерова с соавторами [1 – 4] был введен класс задач huge-scale оптимизации (задачи выпуклой оптимизации, для которых размерность прямого и(или) двойственного пространства не меньше десятков миллионов), и исследовалась роль разреженности в таких задачах. Настоящая работа посвящена изучению конкретного (но, пожалуй, наиболее важного) метода решения таких задач – метода зеркального спуска (МЗС). Это метод представляет собой обобщение метода проекции градиента. Он был предложен в конце 70-х годов прошлого века А.С. Немировским [5]. С тех пор метод получил повсеместное распространение для решения задач больших размерностей, прежде всего, в связи с идеей рандомизации. Метод оказался слабо чувствительным к замене настоящего градиента его несмещенной оценкой. Это обстоятельство активно используется на практике, поскольку построить несмещенную оценку в ряде случаев удается намного дешевле, чем посчитать градиент. Как правило, выгода получается пропорциональной размерности пространства, в котором происходит оптимизация. Однако для разреженных задач тут возникают нюансы, связанные с проработкой правильного сочетания рандомизации и разреженности. Настоящая работа посвящена изучению такого сочетания для МЗС. Данная работа является продолжением работы [3], в которой уже был рассмотрен один сюжет на эту тему (метод Григориадиса–Хачияна для задачи PageRank).

Структура статьи следующая. В п. 2 мы описываем рандомизированный МЗС. Стоит обратить внимание на случай, когда оптимизация происходит на неограниченном множестве, и при этом выводятся оценки вероятностей больших уклонений. Тут есть некоторые тонкости, проработка которых делает п. 2 не просто вводным материалом для последующего изложения, но и представляющим самостоятельный интерес. В п. 3 результаты п. 2 переносятся на задачи с функциональными ограничениями, на которые мы не умеем эффективно проектироваться. В детерминированном случае (когда используется обычный градиент) такого типа задачи рассматривались достаточно давно. Разработаны эффективные способы их редуцирования к задаче с простыми ограничениями. Предлагались различные эффективные методы (Поляк–Шор–Немировский–Нестеров). Однако в случае, когда вместо градиента мы используем его несмещенную оценку (для функционала и ограничений) нам не известны оценки, поэтому в п. 3 приводится соответствующее обобщение МЗС и устанавливаются необходимые в дальнейшем оценки. В п. 4 на основе теоретических заготовок пп. 2, 3 мы описываем класс разреженных задач

(обобщающих задачу PageRank), для которых удается за счет рандомизации получить дополнительную выгоду.

2. Рандомизированный метод зеркального спуска

Рассмотрим задачу выпуклой оптимизации

$$f(x) \rightarrow \min_{x \in Q} . \quad (1)$$

Под решением этой задачи будем понимать такой $\bar{x}^N \in Q \subseteq \mathbb{R}^n$, что с вероятностью $\geq 1 - \sigma$ имеет место неравенство

$$f(\bar{x}^N) - f_* \leq \varepsilon ,$$

где $f_* = f(x_*)$ – оптимальное значение функционала в задаче (1), $x_* \in Q$ – решение задачи (1). На каждой итерации $k=1, \dots, N$ нам доступен стохастический (суб-)градиент $\nabla_x f_k(x, \xi^k)$ в одной, выбранной нами (методом), точке x^k .

Опишем метод зеркального спуска (МЗС) для решения задачи (1) (мы в основном будем следовать работам [5, 6]). Введем норму $\| \cdot \|$ в прямом пространстве (сопряженную норму будем обозначать $\| \cdot \|_*$) и прокс-функцию $d(x)$ сильно выпуклую относительно этой нормы, с константой сильной выпуклости ≥ 1 . Выберем точку старта

$$x^1 = \arg \min_{x \in Q} d(x) ,$$

считаем, что

$$d(x^1) = 0, \quad \nabla d(x^1) = 0 .$$

Введем брегмановское “расстояние”

$$V_x(y) = d(y) - d(x) - \langle \nabla d(x), y - x \rangle .$$

Определим “размер” решения

$$d(x_*) = V_{x^1}(x_*) = R^2 .$$

Определим оператор “проектирования” согласно этому расстоянию

$$\text{Mirr}_{x^k}(v) = \arg \min_{y \in Q} \{ \langle v, y - x^k \rangle + V_{x^k}(y) \} .$$

МЗС для задачи (1) будет иметь вид, см., например, [6]

$$x^{k+1} = \text{Mirr}_{x^k} \left(\alpha \nabla_x f_k(x^k, \xi^k) \right), \quad k = 1, \dots, N .$$

Будем считать, что $\{\xi^k\}_{k=1}^N$ представляет собой последовательность независимых случайных величин, и для всех $x \in Q$ имеют место условия ($k = 1, \dots, N$)

$$1. \quad E_{\xi^k} \left[\nabla_x f_k(x, \xi^k) \right] = \nabla f(x);$$

$$2. \quad E_{\xi^k} \left[\left\| \nabla_x f_k(x, \xi^k) \right\|_*^2 \right] \leq M^2 .$$

В ряде случаев нам также понадобится более сильное условие

$$3. \quad \left\| \nabla_x f_k(x, \xi^k) \right\|_*^2 \leq \tilde{M}^2 \text{ почти наверное по } \xi^k .$$

При выполнении условия 1 для любого $u \in Q$, $k = 1, \dots, N$ имеет место неравенство, см., например, [6]

$$\alpha \langle \nabla_x f_k(x^k, \xi^k), x^k - u \rangle \leq \frac{\alpha^2}{2} \left\| \nabla_x f_k(x^k, \xi^k) \right\|_*^2 + V_{x^k}(u) - V_{x^{k+1}}(u) .$$

Это неравенство несложно получить в случае евклидовой прокс-структуры [7]

$$d(x) = \|x\|_2^2/2, \quad V_x(y) = \|y-x\|_2^2/2.$$

В этом случае МЗС для задачи (1) есть просто вариант обычного метода проекции градиента (см. примеры 1, 2 ниже).

Разделим сначала выписанное неравенство на α и возьмем условное математическое ожидание $E_{\xi^k}[\cdot | \Xi^{k-1}]$ (Ξ^{k-1} – сигма алгебра, порожденная ξ^1, \dots, ξ^{k-1}), затем просуммируем то, что получится по $k=1, \dots, N$, используя условие 1. Затем возьмем от того, что получилось при суммировании, полное математическое ожидание, учитывая условие 2. В итоге, выбрав $u = x_*$, и определив

$$\bar{x}^N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x^k,$$

получим

$$\begin{aligned} N \cdot \left(E[f(\bar{x}^N)] - f_* \right) &\leq \frac{V_{x^1}(x_*)}{\alpha} - \frac{E[V_{x^{N+1}}(x_*)]}{\alpha} + \frac{1}{2} M^2 \alpha N \leq \\ &\leq \frac{R^2}{\alpha} + \frac{1}{2} M^2 \alpha N. \end{aligned}$$

Выбирая¹

$$\alpha = \frac{R}{M} \sqrt{\frac{2}{N}},$$

получим

$$E[f(\bar{x}^N)] - f_* \leq MR \sqrt{\frac{2}{N}}. \quad (2)$$

Заметим, что в детерминированном случае вместо \bar{x}^N можно брать

$$\tilde{x}^N = \arg \min_{k=1, \dots, N} f(x^k).$$

Немного более аккуратные рассуждения (использующие неравенство Азума–Хефдинга) с

$$\alpha = \frac{R}{\tilde{M}} \sqrt{\frac{2}{N}}$$

позволяют уточнить оценку (2) следующим образом (см., например, [8, 9]):

$$f(\bar{x}^N) - f_* \leq \tilde{M} \sqrt{\frac{2}{N}} \left(R + 2\tilde{R} \sqrt{\ln(2/\sigma)} \right) \quad (3)$$

с вероятностью $\geq 1 - \sigma$, где

$$\tilde{R} = \sup_{x \in \tilde{Q}} \|x - x_*\|,$$

$$\tilde{Q} = \left\{ x \in Q : \|x - x_*\|^2 \leq 65R^2 \ln(4N/\sigma) \right\}.$$

Собственно, для справедливости оценки (3) достаточно требовать выполнение условий 1 – 3 лишь на множестве $\tilde{Q} \subseteq Q$. Это замечание существенно, когда рассматриваются неограниченные множества Q (см., например, п. 4).

Оценки (2), (3) являются неулучшаемыми с точностью до мультипликативного числового множителя по N и σ . Наряду с этим можно обеспечить и их неулучшаемость по размерности пространства n , путем “правильного” выбора прокс-функции [5] (такой выбор всегда возможен, и известен для многих важных в приложениях случаев выбора

¹ Можно получить и адаптивный вариант приводимой далее оценки, для этого потребуется использовать метод двойственных усреднений [6, 7]. Впрочем, в [5] имеется адаптивный вариант МЗС.

множества Q). Собственно прокс-структура (новая степень свободы по сравнению с классическим методом проекции градиента) и вводилась для того, чтобы была возможность обеспечить последнее свойство.

В виду того, что мы используем рандомизированный метод и всегда

$$f(\bar{x}^N) - f_* \geq 0,$$

то используя идею амплификации (широко распространенную в Computer Science) можно немного “улучшить” оценку (3). Для этого сначала перепишем оценку (2) в виде

$$E[f(\bar{x}^N)] - f_* \leq \varepsilon,$$

где (здесь N , конечно, должно быть натуральным числом, поэтому эту формулу и последующие формулы такого типа надо понимать с точностью до округления к наименьшему натуральному числу, большему написанного)

$$N = \frac{2M^2R^2}{\varepsilon^2}. \quad (4)$$

Отсюда по неравенству Маркова

$$P(f(\bar{x}^N) - f_* \geq 2\varepsilon) \leq \frac{E[f(\bar{x}^N)] - f_*}{2\varepsilon} \leq \frac{1}{2}.$$

Можно параллельно (независимо) запустить $\log_2(\sigma^{-1})$ траекторий метода. Обозначим \bar{x}_{\min}^N тот из \bar{x}^N на этих траекториях, который доставляет минимальное значение $f(\bar{x}^N)$.

Из выписанного неравенства Маркова получаем, что имеет место неравенство

$$P(f(\bar{x}_{\min}^N) - f_* \geq 2\varepsilon) \leq \sigma.$$

Таким образом, можно не более чем за

$$N = \frac{8M^2R^2}{\varepsilon^2} \log_2(\sigma^{-1})$$

обращений за стохастическим градиентом и не более чем за $\log_2(\sigma^{-1})$ обращений за значением функции найти решение задачи (1) \bar{x}^N с требуемой точностью ε и доверительным уровнем σ .

Как уже отмечалось, во многих приложениях множество Q неограниченно (см., например, п. 4). Поскольку x_* априорно не известно, то это создает проблемы для определения R , которое входит в формулу для расчета шага метода

$$\alpha = \frac{R}{M} \sqrt{\frac{2}{N}}.$$

Однако если мы заранее выбрали желаемую точность ε , то с помощью формулы (4) можно выразить шаг следующим образом

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{M^2}.$$

Рассмотрим три конкретных примера множества Q , которые нам понадобятся в дальнейшем (см. п. 4). В примерах 1, 2 мы не приводим оценки скорости сходимости, поскольку они будут иметь вид (2), (3), т.е. никакой уточняющей информации тут не появляется, в отличие от примера 3.

Пример 1 (все пространство). Предположим, что $Q = \mathbb{R}^n$. Выберем

$$\| \cdot \| = \| \cdot \|_2, \quad d(x) = \frac{1}{2} \|x\|_2^2.$$

Тогда МЗС примет следующий вид ($\alpha = \varepsilon/M^2$, $x^1 = 0$):

$$x^{k+1} = x^k - \alpha \nabla_x f_k(x^k, \xi^k), \quad k = 1, \dots, N. \quad \square$$

Пример 2 (неотрицательный ортант). Предположим, что

$$Q = \mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0\}.$$

Выберем

$$\| \cdot \| = \| \cdot \|_2, \quad d(x) = \frac{1}{2} \|x - \bar{x}\|_2^2, \quad \bar{x} \in \text{int } Q.$$

Тогда МЗС примет следующий вид ($\alpha = \varepsilon/M^2$, $x^1 = \bar{x}$):

$$x^{k+1} = \left[x^k - \alpha \nabla_x f_k(x^k, \xi^k) \right]_+ = \max \{ x^k - \alpha \nabla_x f_k(x^k, \xi^k), 0 \}, \quad k = 1, \dots, N,$$

где $\max \{ \cdot \}$ берется покомпонентно. \square

Пример 3 (симплекс). Предположим, что

$$Q = S_n(1) = \left\{ x \geq 0 : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}.$$

Выберем

$$\| \cdot \| = \| \cdot \|_1, \quad d(x) = \ln n + \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i.$$

Тогда МЗС примет следующий вид:

$$x_i^1 = 1/n, \quad i = 1, \dots, n,$$

при $k = 1, \dots, N$, $i = 1, \dots, n$

$$x_i^{k+1} = \frac{\exp \left(-\sum_{r=1}^k \alpha \frac{\partial f_r(x^r, \xi^r)}{\partial x_i} \right)}{\sum_{l=1}^n \exp \left(-\sum_{r=1}^k \alpha \frac{\partial f_r(x^r, \xi^r)}{\partial x_l} \right)} = \frac{x_i^k \exp \left(-\alpha \frac{\partial f_k(x^k, \xi^k)}{\partial x_i} \right)}{\sum_{l=1}^n x_l^k \exp \left(-\alpha \frac{\partial f_k(x^k, \xi^k)}{\partial x_l} \right)}.$$

Оценки скорости сходимости будут иметь вид:

$$E \left[f(\bar{x}^N) \right] - f_* \leq M \sqrt{\frac{2 \ln n}{N}} \quad (\text{при } \alpha = M^{-1} \sqrt{2 \ln n / N});$$

$$f(\bar{x}^N) - f_* \leq \tilde{M} \sqrt{\frac{2}{N}} \left(\sqrt{\ln n} + 4 \sqrt{\ln(\sigma^{-1})} \right) \quad (\text{при } \alpha = \tilde{M}^{-1} \sqrt{2 \ln n / N})$$

с вероятностью $\geq 1 - \sigma$. \square

Представим себе, что задача (1) видоизменилась следующим образом

$$f(x) \rightarrow \min_{\substack{g(x) \leq 0 \\ x \in Q}}.$$

Можно ли к ней применить изложенный выше подход, если “проектироваться” на множество (в отличие от Q)

$$\{x \in Q : g(x) \leq 0\}$$

мы эффективно не умеем? В случае, когда мы знаем оптимальное значение f_* , то мы можем свести новую задачу к задаче (1)

$$\min_{x \in Q} \{f(x) - f_*, g(x)\} \rightarrow \min.$$

Несложно записать рандомизированный МЗС для такой задачи и применить к ней все, что изложено выше. Однако мы не будем здесь этого делать, поскольку в следующем пункте мы приведем более общий вариант МЗС, который не предполагает, что известно f_* .

3. Рандомизированный метод зеркального спуска с функциональными ограничениями

Рассмотрим задачу

$$f(x) \rightarrow \min_{\substack{g(x) \leq 0 \\ x \in Q}}. \quad (5)$$

Под решением этой задачи будем понимать такой $\bar{x}^N \in Q$, что имеют место неравенства

$$E[f(\bar{x}^N)] - f_* \leq \varepsilon_f = \frac{M_f}{M_g} \varepsilon_g, \quad g(\bar{x}^N) \leq \varepsilon_g,$$

где $f_* = f(x_*)$ – оптимальное значение функционала в задаче (5), $x_* \in Q$ – решение задачи (5). Будем считать, что имеется такая последовательность независимых случайных величин $\{\xi^k\}$ и последовательности $\{\nabla_x f_k(x, \xi^k)\}$, $\{\nabla_x g_k(x, \xi^k)\}$, $k = 1, \dots, N$, что для всех $x \in Q$ имеют место следующие соотношения (можно считать их выполненными при $x \in \tilde{Q}$, см. п. 2 и последующий текст в этом пункте)

$$\begin{aligned} E_{\xi^k} [\nabla_x f_k(x, \xi^k)] &= \nabla f(x), \quad E_{\xi^k} [\nabla_x g_k(x, \xi^k)] = \nabla g(x); \\ E_{\xi^k} [\|\nabla_x f_k(x, \xi^k)\|_*^2] &\leq M_f^2, \quad E_{\xi^k} [\|\nabla_x g_k(x, \xi^k)\|_*^2] \leq M_g^2. \end{aligned}$$

МЗС для задачи (5) будет иметь вид (см., например, в детерминированном случае двойственный градиентный метод из [10])

$$\begin{aligned} x^{k+1} &= \text{Mirr}_{x^k} (h_f \nabla_x f_k(x^k, \xi^k)), \quad \text{если } g(x^k) \leq \varepsilon_g, \\ x^{k+1} &= \text{Mirr}_{x^k} (h_g \nabla_x g_k(x^k, \xi^k)), \quad \text{если } g(x^k) > \varepsilon_g, \end{aligned}$$

где $h_g = \varepsilon_g / M_g^2$, $h_f = \varepsilon_g / (M_f M_g)$, $k = 1, \dots, N$. Обозначим через I множество индексов k , для которых $g(x^k) \leq \varepsilon$. Введем также обозначения

$$[N] = \{1, \dots, N\}, \quad J = [N] \setminus I, \quad N_I = |I|, \quad N_J = |J|, \quad \bar{x}^N = \frac{1}{N_I} \sum_{k \in I} x^k.$$

Тогда имеет место неравенство

$$\begin{aligned} & h_f N_I \cdot (E[f(\bar{x}^N)] - f_*) \leq \\ & \leq h_f E \left[\sum_{k \in I} \langle E_{\xi^k} [\nabla_x f_k(x^k, \xi^k)], x^k - x_* \rangle \right] \leq \frac{h_f^2}{2} \sum_{k \in I} E [\|\nabla_x f_k(x^k, \xi^k)\|_*^2] + \\ & - h_g E \left[\underbrace{\sum_{k \in J} \langle E_{\xi^k} [\nabla_x g_k(x^k, \xi^k)], x^k - x_* \rangle}_{\geq g(x^k) - g(x_*) > \varepsilon_g} \right] + \frac{h_g^2}{2} \sum_{k \in J} E [\|\nabla_x g_k(x^k, \xi^k)\|_*^2] + \\ & + \sum_{k \in [N]} (E[V_{x^k}(x_*)] - E[V_{x^{k+1}}(x_*)]) \leq \\ & \leq \frac{1}{2} h_f^2 M_f^2 N_I - \frac{1}{2 M_g^2} \varepsilon_g^2 N_J + E[V_{x^1}(x_*)] - E[V_{x^{N+1}}(x_*)] = \\ & = \frac{1}{2} \left(h_f^2 M_f^2 + \frac{\varepsilon_g^2}{M_g^2} \right) N_I - \frac{1}{2 M_g^2} \varepsilon_g^2 N + R^2 - E[V_{x^{N+1}}(x_*)]. \end{aligned}$$

Будем считать, что (следует сравнить с формулой (4))

$$N = N(\varepsilon_g) = \frac{2M_g^2 R^2}{\varepsilon_g^2} + 1. \quad (6)$$

Тогда $E[N_f] \geq 1$ и

$$E[f(\bar{x}^N)] - f_* \leq \frac{1}{2} \left(h_f M_f^2 + \frac{\varepsilon_g^2}{M_g^2 h_f} \right) = \frac{M_f}{M_g} \varepsilon_g = \varepsilon_f.$$

Соотношение

$$g(\bar{x}^N) \leq \varepsilon_g$$

следует из того, что по построению $g(x^k) \leq \varepsilon_g$, $k \in I$ и из выпуклости функции $g(x)$.

Заметим, что в детерминированном случае вместо \bar{x}^N можно брать

$$\tilde{x}^N = \arg \min_{k \in I} f(x^k).$$

Если известно, что для всех $x \in \tilde{Q}$ и почти наверное по ξ^k

$$\|\nabla_x f_k(x, \xi^k)\|_*^2 \leq \tilde{M}^2, \quad \|\nabla_x g_k(x, \xi^k)\|_*^2 \leq \tilde{M}^2, \quad k = 1, \dots, N,$$

то для описанного в этом пункте метода (с $\varepsilon = \varepsilon_f = \varepsilon_g$ и $h_f = h_g = \varepsilon/\tilde{M}^2$) вид оценки вероятностей больших уклонений (3) из п. 2 сохранится (оценка получается чуть лучше, чем нижняя оценка из работы [11], когда ограничений-неравенств больше одного, поскольку мы имеем доступ к точному значению $g(x)$)

$$f(\bar{x}^N) - f_* \leq 2\tilde{M} \sqrt{\frac{2}{N}} \left(R + 2\tilde{R} \sqrt{\ln(2/\sigma)} \right),$$

где $N = 2N(\varepsilon)$ (см. формулу (6)). К сожалению, трюк с амплификацией (см. п. 2) здесь уже не проходит в том же виде, как и раньше, поскольку теперь уже нельзя гарантировать

$$f(\bar{x}^N) - f_* \geq 0.$$

Однако если ввести обозначение

$$\varepsilon_\Delta = f_* - \min_{\substack{g(x) \leq \varepsilon_g \\ x \in Q}} f(x) = \min_{\substack{g(x) \leq 0 \\ x \in Q}} f(x) - \min_{\substack{g(x) \leq \varepsilon_g \\ x \in Q}} f(x),$$

то

$$P\left(f(\bar{x}^N) - f_* + \varepsilon_\Delta \geq 2(\varepsilon_f + \varepsilon_\Delta)\right) \leq \frac{E[f(\bar{x}^N)] - f_* + \varepsilon_\Delta}{2(\varepsilon_f + \varepsilon_\Delta)} \leq \frac{1}{2}.$$

Можно параллельно (независимо) запустить $\log_2(\sigma^{-1})$ траекторий метода. Обозначим \bar{x}_{\min}^N тот из \bar{x}^N на этих траекториях, который доставляет минимальное значение $f(\bar{x}^N)$.

Из выписанного неравенства Маркова получаем, что имеет место неравенство

$$P\left(f(\bar{x}_{\min}^N) - f_* \geq 2\varepsilon_f + \varepsilon_\Delta\right) \leq \sigma.$$

К сожалению, этот подход требует малости ε_Δ , что, вообще говоря, нельзя гарантировать из условий задачи.

Немного более аккуратные рассуждения (без новых идей) позволяют развязать во всех приведенных выше в п. 3 рассуждениях ε_f и ε_g , допуская, что они могут выбираться независимо друг от друга. Детали мы вынуждены здесь опустить.

Основные приложения описанного подхода, это задачи вида

$$f(x) \rightarrow \min_{\max_{k=1, \dots, m} \sigma_k(A_k^T x) \leq 0},$$

с разреженной матрицей

$$A = [A_1, \dots, A_m]^T.$$

В частности, задачи вида

$$f(x) \rightarrow \min_{Ax \leq b}$$

и приводящиеся к такому виду задачи

$$f(x) \rightarrow \min_{\substack{Ax \leq b \\ Cx = d}}.$$

В этих задачах, как правило, выбирают $\| \cdot \| = \| \cdot \|_2$, $d(x) = \|x\|_2^2/2$. Подобно [10] можно попутно восстанавливать (без особых дополнительных затрат) и двойственные множители к этим ограничениям. Причем эта процедура позволяет сохранить дешевизну итерации даже в разреженном случае.

4. Примеры решения разреженных задач с использованием рандомизированного метода зеркального спуска

Начнем с известного примера [12], демонстрирующего практически все основные способы рандомизации, которые сейчас активно используются в самых разных приложениях. Рассмотрим задачу поиска левого собственного вектора x , отвечающего собственному значению 1, стохастической по строкам матрицы $P = \|p_{ij}\|_{i,j=1,1}^{n,n}$ (такой вектор называют вектором Фробениуса–Перрона, а с учетом контекста PageRank вектором). Изложение рандомизации, связанной с ускоренными покомпонентными методами мы опускаем, поскольку она не завязана на МЗС. Тем не менее, приведем ссылки на работы, в которых такой подход к поиску PageRank описан: замечание 5 [4] и пример 4 [13] (см. также замечания 10, 11 [14]).

Перепишем задачу поиска вектора PageRank следующим образом [3]

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax\|_2^2 \rightarrow \min_{x \in S_n(1)},$$

где $S_n(1)$ – единичный симплекс в \mathbb{R}^n , $A = P^T - I$, I – единичная матрица. Далее будем использовать обозначения $A^{(k)}$ – k -й столбце матрицы A , A_k – транспонированная k -я строка (то есть A_k – это вектор) матрицы A . Следуя [12], воспользуемся для решения этой задачи рандомизированным МЗС со стохастическим градиентом²

$$\nabla_x f_k(x, \xi^k) = (P - I)^{\langle j(\xi^k) \rangle} - (P - I)^{\langle \xi^k \rangle},$$

где

$$\begin{aligned} \xi^k &= i \text{ с вероятностью } x_i, \quad i = 1, \dots, n; \\ j(\xi^k) &= j \text{ с вероятностью } p_{\xi^k j}, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Несложно проверить выполнение условия 1 п. 2, если генерирование используемых вспомогательных случайных величин осуществляется независимо. В виду симплексных

² Сначала согласно вектору $x \in S_n(1)$ случайно разыгрываем один из столбцов матрицы $A = P^T - I$ (пусть это будет ξ^k -й столбец). Пользуясь тем, что столбцы матрицы P^T сами представляют собой распределения вероятностей, независимо разыгрываем (согласно выбранному столбцу ξ^k) случайную величину, и выбираем соответствующий столбец матрицы $A^T = P - I$, из которого вычитаем $A^T \langle \xi^k \rangle$ (из-за наличия матрицы I), таким образом, конструируется несмещенная оценка градиента $\nabla f(x) = A^T Ax$.

ограничений, естественно следовать при выборе прокс-структуры примеру 3 п. 2. Таким образом, можно оценить

$$\tilde{M}^2 = \max_{x \in S_n(1), \xi^k} \left\| \nabla_x f_k(x, \xi^k) \right\|_\infty^2 \leq 4.$$

Даже в случае, когда матрица P полностью заполнена амортизационная (средняя) стоимость одной итерации будет $O(n)$ (вместо $O(n^2)$, в случае честного расчета градиента). Таким образом, общее число арифметических операций будет $O(n \ln n / \varepsilon^2)$.

К худшей оценке приводит другой способ рандомизации (рандомизации суммы [4]). Чтобы его продемонстрировать, перепишем исходную задачу следующим образом

$$f(x) = n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{2} (A_k^T x)^2 \rightarrow \min_{x \in S_n(1)}.$$

Из такого представления следует, что можно определить стохастический градиент следующим образом

$$\nabla_x f_k(x, \xi^k) = n A_{\xi^k} A_{\xi^k}^T x,$$

где

$$\begin{aligned} \xi^k &= i \text{ с вероятностью } 1/n, \quad i = 1, \dots, n; \\ j(x) &= j \text{ с вероятностью } x_j, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Амортизационная (средняя) стоимость одной итерации будет по-прежнему $O(n)$, но вот оценка \tilde{M}^2 получается похуже. Здесь мы имеем пример, когда M^2 и \tilde{M}^2 существенно отличаются – в действительности, можно вводить промежуточные условия, не такие жесткие, как условие 3, и получать более оптимистичные оценки вероятностей больших отклонений [4].

К сожалению, эти методы не позволяют полноценно воспользоваться разреженностью матрицы P , которая, как правило, имеет место. Собственно, этот пункт отчасти и будет посвящен тому, как можно сочетать рандомизацию и разреженность. В частности, если переписать задачу PageRank следующим образом

$$\|Ax\|_\infty \rightarrow \min_{x \in S_n(1)},$$

что равносильно (факт из теории неотрицательных матриц [15])

$$\max_{k=1, \dots, n} A_k^T x \rightarrow \min_{x \in S_n(1)},$$

то исходя из примера 3 (в детерминированном случае), можно получить следующую оценку [16] на общее число арифметических операций $O(n \ln n / \varepsilon^2)$, при условии, что число элементов в каждой строке и столбце матрицы P не больше $O(\sqrt{n / \ln n})$. Здесь не использовалась рандомизация, а использовалась только разреженность матрицы P (следовательно и A). По-сути, способ получения этой оценки всецело базируется на возможности организации эффективного пересчета субградиента функционала, подобно [1 – 3]. Далее мы распространим этот пример на более общий класс задач, и постараемся привести в подход рандомизацию.

Итак, рассмотрим сначала класс задач с Q из примера 1 или 2 п. 2

$$\max_{k=1, \dots, m} \sigma_k(A_k^T x) \rightarrow \min_{x \in Q}, \quad (7)$$

где $\sigma_k(\cdot)$ – выпуклые функции с константой Липшица равномерно ограниченной известным числом M , (суб-)градиент каждой такой функции (скалярного аргумента) можно рассчитать за $O(1)$. Введем матрицу

$$A = [A_1, \dots, A_m]^T$$

и будем считать, что в каждом столбце матрицы A не больше $s_m \leq m$ ненулевых элементов, а в каждой строке – не больше $s_n \leq n$. Заметим, что некоторую обременительность этим условиям создает требование, что в “каждом” столбце/строке. Это требования можно ослаблять, приближаясь к некоторым средним показателям разреженности (численные эксперименты в этой связи также проводились [3]), однако в данной работе для большей наглядности и строгости рассуждений мы ограничимся случаем, когда именно в каждом столбце/строке имеет место такая (или еще большая) разреженность.

Из работ [1 – 3] следует, что МЗС из примеров 1, 2 (в детерминированном случае) для задачи (7) будет требовать

$$O\left(\frac{M^2 \max_{k=1,\dots,m} \|A_k\|_2^2 R_2^2}{\varepsilon^2}\right)$$

итераций, где R_2^2 – квадрат евклидова расстояния от точки старта до решения, а одна итерация (кроме первой) будет стоить

$$O(s_n s_m \log_2 m).$$

И все это требует препроцессинг (предварительных вычислений, связанных с “правильным” приготовлением памяти) объема $O(m+n)$. Таким образом, в интересных для нас случаях общее число арифметических операций для МЗС из примеров 1, 2 будет

$$O\left(s_n s_m \log_2 m \frac{M^2 \max_{k=1,\dots,m} \|A_k\|_2^2 R_2^2}{\varepsilon^2}\right). \quad (8)$$

Постараемся ввести рандомизацию в описанный подход. Для этого осуществим дополнительный препроцессинг, заключающийся в приготовлении из векторов A_k вектора распределения вероятностей. Представим

$$A_k = A_k^+ - A_k^-,$$

где каждый из векторов A_k^+ , A_k^- имеет не отрицательные компоненты. Согласно этим векторам приготовим память таким образом, чтобы генерирование случайных величин из распределений $A_k^+ / \|A_k^+\|_1$ и $A_k^- / \|A_k^-\|_1$ занимало бы $O(\log_2 n)$. Это всегда можно сделать [3]. Однако это требует хранение в “быстрой памяти” довольно большого количества соответствующих “деревьев”. Весь этот препроцессинг и затраченная память будут пропорциональны числу ненулевых элементов матрицы A , что в случае huge-scale задач сложно осуществить из-за ресурсных ограничений. Тем не менее, далее мы будем считать, что такой препроцессинг можно осуществить, и (самое главное) такую память можно получить. Введем стохастический (суб-)градиент

$$\nabla_x f_k(x, \xi^k) = \|A_{k(x)}^+\|_1 e_{i(\xi^k)} - \|A_{k(x)}^-\|_1 e_{j(\xi^k)},$$

где

$$k(x) \in \text{Arg max}_{k=1,\dots,m} \sigma_k(A_k^T x),$$

причем не важно, какой именно представитель Arg max выбирается;

$$e_i = \underbrace{(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)}_i;$$

$$i(\xi^k) = i \text{ с вероятностью } A_{k(x)i}^+ / \|A_{k(x)}^+\|_1, \quad i = 1, \dots, n;$$

$$j(\xi^k) = j \text{ с вероятностью } A_{k(x)j}^- / \|A_{k(x)}^-\|_1, \quad j = 1, \dots, n.$$

Легко проверить выполнение условия 1 п. 2 (заметим, что $\nabla f(x) = A_{k(x)}$). Также легко оценить

$$\tilde{M}^2 \leq M^2 \max_{k=1, \dots, m} \|A_k\|_1^2.$$

И получить из примеров 1, 2 следующую оценку числа итераций (ограничимся для большей наглядности сходимостью по математическому ожиданию, т.е. без оценок вероятностей больших уклонений)

$$O\left(\frac{M^2 \max_{k=1, \dots, m} \|A_k\|_1^2 R_2^2}{\varepsilon^2}\right)$$

Основная трудоемкость тут в вычислении $k(x)$. Однако, за исключением самой первой итерации можно эффективно организовать переисчисление этой задачи. Действительно, предположим, что уже посчитано $k(x^l)$, а мы хотим посчитать $k(x^{l+1})$. Поскольку согласно примерам 1, 2 x^{l+1} может отличаться x^l только в двух компонентах, то пересчитать $\max_{k=1, \dots, m} \sigma_k(A_k^T x^{l+1})$, исходя из известного $\max_{k=1, \dots, m} \sigma_k(A_k^T x^l)$, можно за (см., например, [1, 3]) $O(2s_m \log_2 m)$. Таким образом, общее ожидаемое число арифметических операций нового рандомизированного варианта МЗС из примеров 1, 2 для задачи (7) будет

$$O\left(s_m \log_2 m \frac{M^2 \max_{k=1, \dots, m} \|A_k\|_1^2 R_2^2}{\varepsilon^2}\right). \quad (9)$$

Для матриц A , все отличные от нуля элементы которых одного порядка, скажем $O(1)$, имеем

$$\max_{k=1, \dots, m} \|A_k\|_2^2 = s_n, \quad \max_{k=1, \dots, m} \|A_k\|_1^2 = s_n^2.$$

В таком случае не стоит ожидать выгоды (формулы (8) и (9) будут выглядеть одинаково). Но если это условие (ненулевые элементы A одного порядка) выполняется не очень точно, то можно рассчитывать на некоторую выгоду.

Рассмотрим теперь более общий класс задач, возникающих, например, при поиске равновесий в транспортных сетях [9]

$$\frac{1}{r} \sum_{k=1}^r \max_{l=a_k+1, \dots, b_k} \sigma_l(A_l^T x) \rightarrow \min_{x \in Q}, \quad (10)$$

$$0 = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = a_3 < \dots < b_{r-1} = a_r < b_r = m.$$

Матрица A и числа s_n , s_m определяются аналогично. Привнося (при расчете стохастического градиента) к описанным выше двум подходам для задачи (7) сначала равновероятный (и независимый от других рандомизаций) выбор одного из слагаемых в этой сумме, получим соответствующие обобщения (для задачи (10)) оценок (8), (9), которые будут иметь точно такой же вид. Только матрица A собирается теперь из всех слагаемых суммы (10).

Возвращаясь к примеру 3, заметим, что все описанные выше конструкции (в том числе, связанные с задачей (10)) можно перенести на этот пример, в случае, когда

$$\sigma_k(A_k^T x) = A_k^T x - b_k.$$

При этом

$$R_2^2 \rightarrow \ln n, \quad M = 1 \text{ (для (8), (9))}$$

$$\max_{k=1,\dots,m} \|A_k\|_2^2 \rightarrow \max_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} |A_{ij}|, \min \{s_n s_m \log_2 m, n\} \rightarrow \max \{s_n s_m \log_2 m, n\} \text{ (для (8))}$$

$$\max_{k=1,\dots,m} \|A_k\|_1^2 \rightarrow \max_{k=1,\dots,m} \|A_k\|_1^2, s_m \log_2 m \rightarrow \max \{s_m \log_2 m, n\} \text{ (для (9)).}$$

Собственно, примера PageRank, изложенный в начале этого пункта, как раз подходил под применение оценки (8).

С помощью п. 3 все написанное выше переносится и на задачи вида

$$f(x) \rightarrow \min_{\substack{Ax \leq b \\ Cx = d}},$$

с разреженными матрицами. Такие задачи играют важную роль, например, при проектировании механических конструкций [2] (Truss topology design). Мы не будем здесь приводить соответствующие рассуждения, поскольку они достаточно очевидны, и заинтересованный читатель сможет осуществить отмеченное обобщение самостоятельно.

Исследование в части 2 выполнено при поддержке гранта РФФИ 14-01-00722-а, исследования в частях 3, 4 при поддержке гранта РФФИ 15-31-20571-мол_а_вед.

Литература

1. *Nesterov Y.E.* Subgradient methods for huge-scale optimization problems // CORE Discussion Paper 2012/2. 2012.
2. *Nesterov Yu., Shpirko S.* Primal-dual subgradient method for huge-scale linear conic problem // Optimization online, 2012.
http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2012/08/3590.pdf
3. *Аникин А.С., Гасников А.В., Горнов А.Ю., Камзолов Д.И., Максимов Ю.В., Нестеров Ю.Е.* Эффективные численные методы решения задачи PageRank для дважды разреженных матриц // Труды МФТИ. 2015. Т. 7. № 4. С. 74–94. [arXiv:1508.07607](https://arxiv.org/abs/1508.07607)
4. *Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Нестеров Ю.Е.* Стохастические градиентные методы с неточным оракулом // Труды МФТИ. 2016. Т. 8. (подана) [arxiv:1411.4218](https://arxiv.org/abs/1411.4218)
5. *Nemirovski A.* Lectures on modern convex optimization analysis, algorithms, and engineering applications. Philadelphia: SIAM, 2013.
http://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/Lect_ModConvOpt.pdf
6. *Allen-Zhu Z., Orecchia L.* Linear coupling: An ultimate unification of gradient and mirror descent // e-print, 2014. [arXiv:1407.1537](https://arxiv.org/abs/1407.1537)
7. *Nesterov Y.* Primal-dual subgradient methods for convex problems // Math. Program. Ser. B. 2009. V. 120(1). P. 261–283.
8. *Juditsky A., Nemirovski A.* First order methods for nonsmooth convex large-scale optimization, I, II. In: Optimization for Machine Learning. Eds. S. Sra, S. Nowozin, S. Wright. MIT Press, 2012.
9. *Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Дорн Ю.В., Максимов Ю.В.* Численные методы поиска равновесного распределения потоков в модели Бэкмана и модели стабильной динамики // Математическое моделирование. 2016. Т. 28. (в печати) [arXiv:1506.00293](https://arxiv.org/abs/1506.00293)
10. *Nesterov Yu.* New primal-dual subgradient methods for convex optimization problems with functional constraints // International Workshop “Optimization and Statistical Learning”. January 11–16. France, Les Houches, 2015.
<http://lear.inrialpes.fr/workshop/osl2015/program.html>
11. *Немировский А.С., Юдин Д.Б.* Сложность задач и эффективность методов оптимизации. М.: Наука, 1979.

12. Назин А.В., Поляк Б.Т. Рандомизированный алгоритм нахождения собственного вектора стохастической матрицы с применением к задаче PageRank // Автоматика и телемеханика. 2011. № 2. С. 131–141.
13. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Усманова И.Н. О нетривиальности быстрых (ускоренных) рандомизированных методов // Труды МФТИ. 2016. Т. 8. (подана) [arXiv:1508.02182](https://arxiv.org/abs/1508.02182)
14. Аникин А.С., Двуреченский П.Е., Гасников А.В., Тюрин А.И., Чернов А.В. Двойственные подходы к задачам минимизации сильно выпуклых функционалов простой структуры при аффинных ограничениях // ЖВМ и МФ. 2016. Т. 56. (подана) [arXiv:1602.01686](https://arxiv.org/abs/1602.01686)
15. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972.
16. Гасников А.В., Дмитриев Д.Ю. Об эффективных рандомизированных алгоритмах поиска вектора PageRank // ЖВМ и МФ. Т. 55. № 3. 2015. С.355–371.