

離散数理工学 第3回 数え上げの基礎：漸化式の解き方（基礎）

岡本 吉央
okamotoy@uec.ac.jp

電気通信大学

2015年10月27日

最終更新：2015年10月27日 19:08

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

1 / 39

スケジュール 後半（予定）

9 離散確率論：確率の復習と確率不等式	(12/15)
* 中間試験	(12/22)
10 離散確率論：確率的離散システムの解析	(1/5)
11 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム（基礎）	(1/12)
12 離散確率論：乱択データ構造とアルゴリズム（発展）	(1/19)
13 離散確率論：マルコフ連鎖（基礎）	(1/26)
14 離散確率論：マルコフ連鎖（発展）	(2/2)
* 予備日	(2/9)
* 期末試験	(2/16?)

注意：予定の変更もありうる

スケジュール 前半（予定）

1 数え上げの基礎：二項係数と二項定理	(10/6)
* 休講（体育祭）	(10/13)
2 数え上げの基礎：漸化式の立て方	(10/20)
3 数え上げの基礎：漸化式の解き方（基礎）	(10/27)
* 祝日で休み	(11/3)
4 数え上げの基礎：漸化式の解き方（発展）	(11/10)
5 離散代数：整数と有限体	(11/17)
6 離散代数：多項式環	(11/24)
7 離散代数：多項式環による有限体の構成	(12/1)
8 離散代数：有限体の応用	(12/8)

注意：予定の変更もありうる

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

2 / 39

今日の目標

今日の目標

漸化式を解けるようになる

- ▶ 線形漸化式の解法
- ▶ 上界の導出法

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

3 / 39

目次

線形漸化式の厳密解法

① 線形漸化式の厳密解法

② 漸化式より上界を導出する方法

③ 今日のまとめ

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

4 / 39

線形漸化式の厳密解法

（第2回講義より）

$a_n = \text{グラフ } P_n \text{ における独立集合の総数}$ とする

漸化式

$$a_n = \begin{cases} 2 & (n=1 \text{ のとき}) \\ 3 & (n=2 \text{ のとき}) \\ a_{n-1} + a_{n-2} & (n \geq 3 \text{ のとき}) \end{cases}$$

これを解いてみる

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

5 / 39

線形漸化式の解き方(1)

1 a_n を λ^n で置き換えた式を考える

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

↓

$$\lambda^n = \lambda^{n-1} + \lambda^{n-2}$$

すなわち、

$$\lambda^2 = \lambda + 1$$

これを考へている漸化式の特性方程式と呼ぶ

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

6 / 39

線形漸化式の解き方(1)

2 特性方程式を解く

$$\lambda^2 = \lambda + 1$$

すなわち、

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$
$$\therefore \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

この2つの解を λ_1, λ_2 と書くとする

$$\lambda_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

7 / 39

岡本 吉央（電通大）

離散数理工学(3)

2015年10月27日

8 / 39

線形漸化式の解き方 (1)

漸化式

$$a_n = \begin{cases} 2 & (n=1 \text{ のとき}) \\ 3 & (n=2 \text{ のとき}) \\ a_{n-1} + a_{n-2} & (n \geq 3 \text{ のとき}) \end{cases}$$

- つまり, $a_1 = 2$ と $a_2 = 3$ であることを忘れれば,
 $a_n = \lambda_1^n$ と $a_n = \lambda_2^n$ はこの漸化式の解である
- このとき, 線形結合 $a_n = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n$ もこの漸化式の解である

$$\begin{aligned} \text{なぜならば, } a_n &= c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n \\ a_{n-1} + a_{n-2} &= c_1(\lambda_1^{n-1} + \lambda_1^{n-2}) + c_2(\lambda_2^{n-1} + \lambda_2^{n-2}) \\ &= c_1(\lambda_1^{n-1} + \lambda_2^{n-1}) + c_2(\lambda_1^{n-2} + \lambda_2^{n-2}) \\ &= c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n \end{aligned}$$

- $a_1 = 2$ と $a_2 = 3$ を思い出すと, c_1, c_2 が定まる

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

9 / 39

線形漸化式の解き方 (1)

■ λ_1^n と λ_2^n の線形結合を作る

- $a_n = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n$ とする
- $a_1 = 2, a_2 = 3$ なので,

$$\begin{aligned} 2 &= c_1\lambda_1 + c_2\lambda_2, \\ 3 &= c_1\lambda_1^2 + c_2\lambda_2^2 \end{aligned}$$

- c_1, c_2 を変数として, これを解くと

$$c_1 = \frac{2\lambda_2 - 3}{\lambda_1(\lambda_2 - \lambda_1)}, c_2 = \frac{-2\lambda_1 + 3}{\lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1)}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

9 / 39

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

10 / 39

線形漸化式の解き方 (1)

4 整理する

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{2\lambda_2 - 3}{\lambda_1(\lambda_2 - \lambda_1)} = \frac{\frac{2(1+\sqrt{5})}{2} - 3}{\frac{1-\sqrt{5}}{2}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)} = \frac{5 - 3\sqrt{5}}{10} \\ c_2 &= \frac{-2\lambda_1 + 3}{\lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1)} = \frac{-2\frac{1-\sqrt{5}}{2} + 3}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)} = \frac{5 + 3\sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

したがって, 任意の自然数 $n \geq 1$ に対して

$$a_n = \frac{5 - 3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5 + 3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n$$

となる

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

11 / 39

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

12 / 39

線形漸化式の解き方 (2)

1 行列を用いて書き換える

$$a_n = \begin{cases} 2 & (n=1 \text{ のとき}) \\ 3 & (n=2 \text{ のとき}) \\ a_{n-1} + a_{n-2} & (n \geq 3 \text{ のとき}) \end{cases}$$

↓

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} \quad (n \geq 3 \text{ のとき}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

13 / 39

線形漸化式の解き方 (2) : 一般論

次のように線形漸化式を書けたとする

$$x_1 = c, \quad x_n = Ax_{n-1} \quad (n \geq 2 \text{ のとき})$$

 A は正方行列, x_1, x_2, x_3, \dots と c はベクトル

- このとき,

$$x_n = A^{n-1}x_1 = A^{n-1}c$$

- したがって, A^{n-1} が計算できればよい

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

13 / 39

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

14 / 39

線形漸化式の解き方 (2)

2 行列の累乗を計算する

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ とする}$$

- A の固有値と固有ベクトルを計算する

- A の特性方程式 $\det(\lambda I - A) = 0$

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)\lambda - 1 = 0$$

- これを解くと, $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

- これが A の固有値で, λ_1, λ_2 と書くことにする

$$\lambda_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

15 / 39

線形漸化式の解き方 (2)

 λ_1 に対する A の固有ベクトルを $v_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とすると

$$\begin{aligned} Av_1 &= \lambda_1 v_1 \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \lambda_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x+y \\ x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda_1 x \\ \lambda_1 y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ は λ_1 に対する A の固有ベクトル

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

15 / 39

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

16 / 39

線形漸化式の解き方(2)

λ_2 に対する A の固有ベクトルを $v_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とすると

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x+y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_2 x \\ \lambda_2 y \end{pmatrix}$$

したがって、 $v_2 = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ は λ_2 に対する A の固有ベクトル

線形漸化式の解き方(2)

これによって対角化： $U = (v_1 \ v_2)$, $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ とすると

$$AU = U\Lambda, \quad \text{すなわち}, \quad A = U\Lambda U^{-1}$$

$$\triangleright A^n = (U\Lambda U^{-1})^n = U\Lambda^n U^{-1} = U \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} U^{-1}$$

$$\triangleright U = (v_1 \ v_2) = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{5} & 1 + \sqrt{5} \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \text{なので}, \quad U^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{5+\sqrt{5}}{20} \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{5-\sqrt{5}}{20} \end{pmatrix}$$

線形漸化式の解き方(2)

したがって

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{5} & 1 + \sqrt{5} \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{5+\sqrt{5}}{20} \\ \frac{\sqrt{5}}{10} & \frac{5-\sqrt{5}}{20} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{(5-\sqrt{5})\lambda_1^n + (5+\sqrt{5})\lambda_2^n}{10} & \frac{-\sqrt{5}\lambda_1^n + \sqrt{5}\lambda_2^n}{5} \\ \frac{-5\lambda_1^n + \sqrt{5}\lambda_2^n}{5} & \frac{(5+\sqrt{5})\lambda_1^n + (5-\sqrt{5})\lambda_2^n}{10} \end{pmatrix}$$

線形漸化式の解き方(2)

したがって、 $n \geq 3$ のとき

$$a_n = \frac{5-3\sqrt{5}}{10}\lambda_1^n + \frac{5+3\sqrt{5}}{10}\lambda_2^n$$

$$= \frac{5-3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5+3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

となる($n=1,2$ のときも、この式は正しい)

□

線形漸化式の解き方(2)

① 行列を用いて書き換える

$$b_n = \begin{cases} 3 & (n=1 \text{ のとき}) \\ c_n + c_{n-1} & (n \geq 2 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$c_n = \begin{cases} 2 & (n=1 \text{ のとき}) \\ b_{n-1} + c_{n-1} & (n \geq 2 \text{ のとき}) \end{cases}$$

↓

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{pmatrix} \quad (n \geq 2 \text{ のとき})$$

後は同様に、計算する

線形漸化式の解き方(2)

③ まとめ

$n \geq 3$ のとき、

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} = A^{n-2} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{(5-\sqrt{5})\lambda_1^{n-2} + (5+\sqrt{5})\lambda_2^{n-2}}{10} & \frac{-\sqrt{5}\lambda_1^{n-2} + \sqrt{5}\lambda_2^{n-2}}{5} \\ \frac{-\sqrt{5}\lambda_1^{n-2} + \sqrt{5}\lambda_2^{n-2}}{5} & \frac{(5+\sqrt{5})\lambda_1^{n-2} + (5-\sqrt{5})\lambda_2^{n-2}}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{15-7\sqrt{5}}{10}\lambda_1^{n-2} + \frac{15+7\sqrt{5}}{10}\lambda_2^{n-2} \\ \frac{5-2\sqrt{5}}{5}\lambda_1^{n-2} + \frac{5+2\sqrt{5}}{5}\lambda_2^{n-2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{5-3\sqrt{5}}{10}\lambda_1^{n-1} + \frac{5+3\sqrt{5}}{10}\lambda_2^{n-1} \\ \frac{5-3\sqrt{5}}{10}\lambda_1^{n-1} + \frac{5+3\sqrt{5}}{10}\lambda_2^{n-1} \end{pmatrix}$$

例： $P_n \times P_2$ から得られたグラフ — まとめ

(第2回講義より)

次のように定義

- ▶ b_n = グラフ G_n における独立集合の総数
- ▶ c_n = グラフ H_n における独立集合の総数

漸化式

$$b_n = \begin{cases} 3 & (n=1 \text{ のとき}) \\ c_n + c_{n-1} & (n \geq 2 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$c_n = \begin{cases} 2 & (n=1 \text{ のとき}) \\ b_{n-1} + c_{n-1} & (n \geq 2 \text{ のとき}) \end{cases}$$

これを解いてみる

線形漸化式の解き方(2)

計算すると、次が得られる(はずである)：自然数 $n \geq 1$ に対して

$$b_n = \frac{1-\sqrt{2}}{2}(1-\sqrt{2})^n + \frac{1+\sqrt{2}}{2}(1+\sqrt{2})^n$$

$$c_n = \frac{2-\sqrt{2}}{4}(1-\sqrt{2})^n + \frac{2+\sqrt{2}}{4}(1+\sqrt{2})^n$$

① 線形漸化式の厳密解法

② 漸化式より上界を導出する方法

③ 今日のまとめ

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

25 / 39

線形漸化式から上界を導く

① 定数項を取り除く

- 両辺に 1 を足す

$$f_n + 1 = 1 + f_{n-1} + f_{n-2} + 1 = (f_{n-1} + 1) + (f_{n-2} + 1)$$

- ここで, $f'_n = f_n + 1$ と置くと

$$f'_n = \begin{cases} 2 & (n \leq 2 のとき) \\ f'_{n-1} + f'_{n-2} & (n \geq 3 のとき) \end{cases}$$

- 帰結: f_n と f'_n のオーダーは同じ

- 注意: ここから f'_n を厳密に求めて, f_n を求めてもよいが, ここではそうしない

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

27 / 39

線形漸化式から上界を導く

③ 数学的帰納法で不等式を証明

ここで, 次を証明する

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $f'_n \leq 2\lambda^n$ 証明: $n = 1$ のとき

- $f'_1 = 2$
- $2\lambda^1 = 2 \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \sqrt{5}$
- したがって, $f'_1 < 2\lambda^1$ となる

 $n = 2$ のとき

- $f'_2 = 2$
- $2\lambda^2 > 2\lambda = 1 + \sqrt{5}$
- したがって, $f'_2 < 2\lambda^2$ となる

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

29 / 39

オーダー記法: 復習

O 記法の定義

非負の値を取る数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ と $\{b_n\}_{n \geq 1}$ に対して,

$$a_n = O(b_n)$$

であるとは,
ある自然数 n_0 と正の実数 C が存在して,
任意の自然数 $n \geq n_0$ に対して

$$a_n \leq Cb_n$$

が成り立つこと

 $a_n = O(b_n)$ であることの直感的な意味数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ の増加率は数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ の増加率以下である

単純な再帰アルゴリズム

```
1: def fnct(n)
2:   print "a"
3:   if n > 2
4:     fnct(n-1)
5:     fnct(n-2)
6:   end
7: end
```

出力される a の数に対する漸化式

$$f_n = \begin{cases} 1 & (n \leq 2 のとき) \\ 1 + f_{n-1} + f_{n-2} & (n \geq 3 のとき) \end{cases}$$

ここでは, 簡単な上界を求めてみる
(計算量の解析において, 欲しいものは上界(で十分なこと)が多い)

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

26 / 39

線形漸化式から上界を導く

② 特性方程式を解く

$$f'_n = \begin{cases} 2 & (n \leq 2 のとき) \\ f'_{n-1} + f'_{n-2} & (n \geq 3 のとき) \end{cases}$$

- 特性方程式: $\lambda^n = \lambda^{n-1} + \lambda^{n-2}$
- この方程式はただ 1 つ正の解を持ち, それは

$$\lambda = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

である

ただ 1 つ正の解を持つことは,
例えば「デカルトの符号規則」から分かる

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

28 / 39

線形漸化式から上界を導く

証明の続き: 自然数 $k \geq 2$ が $f'_k \leq 2\lambda^k$ と $f'_{k-1} \leq 2\lambda^{k-1}$ を満たすと仮定

証明すること

$$f'_{k+1} \leq 2\lambda^{k+1}$$

$$\begin{aligned} f'_{k+1} &= f'_k + f'_{k-1} && (f'_k の定義) \\ &\leq 2\lambda^k + 2\lambda^{k-1} && (\text{帰納法の仮定}) \\ &= 2\lambda^{k-1}(\lambda + 1) && (\text{整理}) \\ &= 2\lambda^{k-1}\lambda^2 && (\lambda が特性方程式の解であるから) \\ &= 2\lambda^{k+1} && (\text{整理}) \end{aligned}$$

帰結

$$f_n = O\left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

30 / 39

ユークリッドのアルゴリズムの計算量

漸化式

$$g_n = \begin{cases} 1 & (n = 0 のとき) \\ \leq 2 + g_{\lfloor n/2 \rfloor} & (n \geq 1 のとき) \end{cases}$$

まずは g_n がどのように増加するか知る必要があるので, それを探る

- 「 \leq 」を「 $=$ 」に置き換える
- $n = 2^k$ の場合だけを考える ($n = 2^k$ のとき, $\lfloor n/2 \rfloor = 2^{k-1}$)

注: $g_1 \leq 2 + g_{\lfloor 1/2 \rfloor} = 2 + g_0 = 2 + 1 = 3$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

31 / 39

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

32 / 39

ユークリッドのアルゴリズムの計算量：探る

$$g'_k = \begin{cases} 3 & k = 0 \text{ のとき} \\ 2 + g'_{k-1} & k \geq 1 \text{ のとき} \end{cases}$$

▶ これは等差数列

▶ 任意の自然数 $k \geq 0$ に対して, $g'_k = 2k + 3$

つまり, g_n はだいたい $2\log_2 n$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

33 / 39

証明すること

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

証明の続き：自然数 k に対して,

任意の自然数 $\ell \leq k$ に対して $g_\ell \leq 3 + 2\log_2 \ell$ が成り立つと仮定

証明すべきこと

$$g_{k+1} \leq 3 + 2\log_2(k+1)$$

$$\begin{aligned} g_{k+1} &\leq 2 + g_{\lfloor(k+1)/2\rfloor} && (g_n \text{ の定義}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2\lfloor(k+1)/2\rfloor && (\text{帰納法の仮定}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2((k+1)/2) && (\lfloor \cdot \rfloor \text{ を外す}) \\ &= 5 + 2(\log_2(k+1) - \log_2 2) && (\text{整理}) \\ &= 3 + 2\log_2(k+1) && (\text{整理}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

35 / 39

今日の目標

今日の目標

漸化式を解けるようになる

- ▶ 線形漸化式の解法

- ▶ 上界の導出法

証明すること

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

帰結

$$g_n = O(\log n)$$

証明 : $n = 1$ のとき

▶ 漸化式より, $g_1 \leq 2 + g_{\lfloor 1/2 \rfloor} = 2 + g_0 = 2 + 1 = 3$

▶ $3 + 2\log_2 n = 3 + 2\log_2 1 = 3 + 0 = 3$

▶ したがって, 左辺 \leq 右辺

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

33 / 39

目次

① 線形漸化式の厳密解法

② 漸化式より上界を導出する方法

③ 今日のまとめ

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

34 / 39

今日のまとめ

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

証明の続き：自然数 k に対して,

任意の自然数 $\ell \leq k$ に対して $g_\ell \leq 3 + 2\log_2 \ell$ が成り立つと仮定

証明すべきこと

$$g_{k+1} \leq 3 + 2\log_2(k+1)$$

$$\begin{aligned} g_{k+1} &\leq 2 + g_{\lfloor(k+1)/2\rfloor} && (g_n \text{ の定義}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2\lfloor(k+1)/2\rfloor && (\text{帰納法の仮定}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2((k+1)/2) && (\lfloor \cdot \rfloor \text{ を外す}) \\ &= 5 + 2(\log_2(k+1) - \log_2 2) && (\text{整理}) \\ &= 3 + 2\log_2(k+1) && (\text{整理}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

35 / 39

今日のまとめ

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

証明の続き：自然数 k に対して,

任意の自然数 $\ell \leq k$ に対して $g_\ell \leq 3 + 2\log_2 \ell$ が成り立つと仮定

証明すべきこと

$$g_{k+1} \leq 3 + 2\log_2(k+1)$$

$$\begin{aligned} g_{k+1} &\leq 2 + g_{\lfloor(k+1)/2\rfloor} && (g_n \text{ の定義}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2\lfloor(k+1)/2\rfloor && (\text{帰納法の仮定}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2((k+1)/2) && (\lfloor \cdot \rfloor \text{ を外す}) \\ &= 5 + 2(\log_2(k+1) - \log_2 2) && (\text{整理}) \\ &= 3 + 2\log_2(k+1) && (\text{整理}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

36 / 39

今日のまとめ

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

証明の続き：自然数 k に対して,

任意の自然数 $\ell \leq k$ に対して $g_\ell \leq 3 + 2\log_2 \ell$ が成り立つと仮定

証明すべきこと

$$g_{k+1} \leq 3 + 2\log_2(k+1)$$

$$\begin{aligned} g_{k+1} &\leq 2 + g_{\lfloor(k+1)/2\rfloor} && (g_n \text{ の定義}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2\lfloor(k+1)/2\rfloor && (\text{帰納法の仮定}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2((k+1)/2) && (\lfloor \cdot \rfloor \text{ を外す}) \\ &= 5 + 2(\log_2(k+1) - \log_2 2) && (\text{整理}) \\ &= 3 + 2\log_2(k+1) && (\text{整理}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

37 / 39

今日のまとめ

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

証明の続き：自然数 k に対して,

任意の自然数 $\ell \leq k$ に対して $g_\ell \leq 3 + 2\log_2 \ell$ が成り立つと仮定

証明すべきこと

$$g_{k+1} \leq 3 + 2\log_2(k+1)$$

$$\begin{aligned} g_{k+1} &\leq 2 + g_{\lfloor(k+1)/2\rfloor} && (g_n \text{ の定義}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2\lfloor(k+1)/2\rfloor && (\text{帰納法の仮定}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2((k+1)/2) && (\lfloor \cdot \rfloor \text{ を外す}) \\ &= 5 + 2(\log_2(k+1) - \log_2 2) && (\text{整理}) \\ &= 3 + 2\log_2(k+1) && (\text{整理}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

38 / 39

今日のまとめ

今から証明すること

任意の自然数 $n \geq 1$ に対して, $g_n \leq 3 + 2\log_2 n$

証明の続き：自然数 k に対して,

任意の自然数 $\ell \leq k$ に対して $g_\ell \leq 3 + 2\log_2 \ell$ が成り立つと仮定

証明すべきこと

$$g_{k+1} \leq 3 + 2\log_2(k+1)$$

$$\begin{aligned} g_{k+1} &\leq 2 + g_{\lfloor(k+1)/2\rfloor} && (g_n \text{ の定義}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2\lfloor(k+1)/2\rfloor && (\text{帰納法の仮定}) \\ &\leq 2 + 3 + 2\log_2((k+1)/2) && (\lfloor \cdot \rfloor \text{ を外す}) \\ &= 5 + 2(\log_2(k+1) - \log_2 2) && (\text{整理}) \\ &= 3 + 2\log_2(k+1) && (\text{整理}) \end{aligned}$$

岡本 吉央 (電通大)

離散数理工学 (3)

2015 年 10 月 27 日

39 / 39