

ЛОГІКИ ЗАГАЛЬНИХ НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ ПРЕДИКАТИВ: СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ

М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк

Досліджено семантичні аспекти нового класу програмно-орієнтованих логічних формалізмів – логік загальних недетермінованих квазіарних предикатів, або *GND*-предикатів. Виділено різновиди таких предикатів, досліджено властивості їх композицій, розглянуто композиційні алгебри *GND*-предикатів. Описано мови чистих першопорядкових логік *GND*-предикатів. Запропоновано та досліджено відношення логічного наслідку для множин формул. Описано властивості декомпозиції формул та елімінації кванторів.

Ключові слова: логіка, алгебра, композиція, недетермінований предикат, логічний наслідок.

Исследованы семантические аспекты нового класса программно-ориентированных логических формализмов – логик общих недетерминированных квазиарных предикатов, или *GND*-предикатов. Выделены разновидности таких предикатов, исследованы свойства их композиций, рассмотрены композиционные алгебры *GND*-предикатов. Описаны языки чистых первопорядковых логик *GND*-предикатов. Предложены и исследованы отношения логического следствия для множеств формул. Описаны свойства декомпозиции формул и элиминации кванторов.

Ключевые слова: логика, алгебра, композиция, недетерминированный предикат, логическое следствие.

Semantic aspects of a new class of program-oriented logical formalisms – logics of general non-deterministic quasiary predicates (*GND*-predicates) – are considered. Classes of *GND*-predicates are singled out, their compositions and algebras are investigated. The language of pure first-order logics of *GND*-predicates is described. The relation of the logical consequence for the sets of formulas is proposed and investigated. The properties of the decomposition of formulas and of quantifier elimination are described.

Key words: logic, algebra, composition, non-deterministic predicate, logical consequence.

Вступ

Розвиток інформаційних технологій та їх проникнення в усі сфери діяльності людини роблять першорядною задачу створення ефективних і надійних програмних систем. Основою, ядром таких систем є апарат математичної логіки. Водночас поява все нових задач і проблем, які виникають в процесі розвитку інформатики й програмування, індукує їх зворотний вплив на логіку, вимагає зробити її більшою й адекватнішою до потреб програмування. На даний час розроблено (див., напр., [1]) низку різноманітних логічних систем, які успішно застосовуються в інформатіці й програмуванні. В їх основі зазвичай лежить класична логіка предикатів та базовані на ній спеціальні логіки (модальні, темпоральні, епістемічні, програмні тощо). Проте класична логіка має принципові обмеження, які істотно ускладнюють її використання. Характерним для програмування є широке використання часткових неоднозначних відображенів над неповними даними, а класична логіка предикатів базується на традиційних математичних структурах однозначних тотальніх скінченно-арних відображень.

Обмеження класичної логіки предикатів виводять на перший план проблему побудови нових, програмно-орієнтованих логічних формалізмів. Природною основою такої побудови є спільний для логік й програмування композиційно-номінативний підхід. Логіки, збудовані на його основі, названо композиційно-номінативними (КНЛ). Передумовою їх виникнення стала необхідність посилення можливостей класичної логіки для розв'язання нових задач інформатики й програмування. КНЛ базуються на загальних класах часткових відображень, заданих на довільних наборах іменованих значень. Такі набори названо номінативними даними. Однорівневі однозначні номінативні дані названо іменними множинами (ІМ). Відображення, задані на ІМ, названо квазіарними. Низку різноманітних класів КНЛ квазіарних предикатів описано та досліджено в [2–7].

Метою даної роботи є дослідження нових класів програмно-орієнтованих логічних формалізмів – КНЛ загальних недетермінованих квазіарних предикатів. Ці логіки відображають такі властивості програм, як частковість, недетермінізм, нефіксовану арність. Огляд недетермінованих пропозиційних логік та логік недетермінованих n -арних предикатів наведено в [8]. Загальні недетерміновані квазіарні предикати, названі *GND*-предикатами, запропоновано в [9]. Вони є узагальненням часткових неоднозначних предикатів реляційного типу [3]. Композиційні алгебри *GND*-предикатів досліджено в [10]. Показано зв'язок *GND*-предикатів із 7-значними тотальними детермінованими предикатами, описано мови чистих першопорядкових логік *GND*-предикатів.

Вивчення семантических аспектів *GND*-предикатів триває в даній роботі. Виділено різновиди *GND*-предикатів, розглянуто властивості їх композицій, описано композиційні алгебри та мови логік *GND*-предикатів. Досліджено відношення логічного наслідку для множин формул. Визначено відношення *G*-наслідку, логічного *G*-наслідку та логічного *SG*-наслідку, описано властивості цих відношень. Досліджено властивості декомпозиції формул та елімінації кванторів. Ці властивості є семантичною основою подальшої побудови числень секвенційного типу для логік *GND*-предикатів.

Поняття, які тут не визначаються, тлумачимо в сенсі [2, 3, 6]. Нагадаємо лише базові визначення.

V - A -іменна множина (V - A -IM) – це часткова однозначна функція вигляду $d : V \rightarrow A$. Трактуємо V і A як множину предметних імен (змінних) і множину предметних значень. Клас всіх V - A -IM позначаємо ${}^V A$.

Під V - A -квазіарним предикатом розуміємо часткову неоднозначну, взагалі кажучи, функцію вигляду $P : {}^V A \rightarrow \{T, F\}$. Тут $\{T, F\}$ – множина істиннісних значень.

1. Загальні недетерміновані предикати та їх різновиди

Поняття недетермінованого (неоднозначного) предиката в загальному випадку описано в [10]. Такий предикат на деяких даних через нечіткість та невизначеність інформації може функціонувати недетермінованим чином: на одному і тому ж даному може приймати значення T , приймати значення F , а може і не приймати жодного значення. Наприклад (див. [10]), це можуть бути різні екземпляри одного і того ж предиката, що є компонентами складнішого: на одному і тому ж даному одні екземпляри прийняли значення T , інші екземпляри – значення F , а деякі екземпляри зациклились і не приймають жодного значення.

Таким чином, недетермінований предикат $P : {}^V A \rightarrow \{T, F\}$ при застосуванні до певного $d \in {}^V A$ може приймати значення T , приймати значення F , а також може не приймати жодного значення, тобто може бути невизначенім. Для кожного $d \in {}^V A$ має бути принаймні одна з цих ситуацій, що загалом дає 7 можливостей для прийняття значення при застосуванні до певного даного. Так описані недетерміновані квазіарні предикати загального вигляду названо *GND-предикатами*. Клас V - A -квазіарних GND-предикатів позначимо PrG_{V-A} .

Нехай $P[d]$ – множина значень, які недетермінований предикат P може прийняти на $d \in {}^V A$, тоді $P[d]$ може бути однією з множин $\{\emptyset\}$, $\{T\}$, $\{F\}$, $\{T, F\}$, $\{T, \emptyset\}$, $\{F, \emptyset\}$, $\{T, F, \emptyset\}$. Скорочено позначимо їх \uparrow , T , F , TF , $T\uparrow$, $F\uparrow$, $TF\uparrow$. Таким чином, GND-предикати можна моделювати як 7-значні тотальні детерміновані предикати, які названо [10] TD7-предикатами. Множиною істиннісних значень цих предикатів є $TV_7 = \{\uparrow, T, F, TF, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$. Зв'язок GND-предикатів та TD7-предикатів досліджено в [10], основні результати наведено нижче.

В роботах [3–7] часткові неоднозначні квазіарні предикати ми трактували дещо огрублено, як відповідності (відношення) між множинами ${}^V A$ та $\{T, F\}$, їх було названо *R-предикатами* – предикатами реляційного типу. Кожний R-предикат $P : {}^V A \rightarrow \{T, F\}$ при застосуванні до певного даного $d \in {}^V A$ може приймати лише значення T , лише значення F , обидва значення T та F , а також може бути невизначенім – всього маємо 4 можливості.

Таким чином, для R-предиката P множиною значень $P[d]$, які P може прийняти на $d \in {}^V A$, може бути одна з множин $\{\emptyset\}$, $\{T\}$, $\{F\}$, $\{T, F\}$. Клас V - A -квазіарних R-предикатів тут будемо позначати PrR_{V-A} .

Зауважимо, що для класичних предикатів є лише 2 можливості – T чи F – для прийняття значення при застосуванні до певного даного, адже вони є тотальними однозначним відображеннями $P : A^X \rightarrow \{T, F\}$, $X \subseteq V$.

Кожний V - A -квазіарний GND-предикат P можна однозначно описати за допомогою 3-х множин: *області істинності* $T(P)$, *області хибності* $F(P)$ та *області невизначеності* $\perp(P)$. Ці множини задаються так:

- $T(P) = \{d \in {}^V A \mid P \text{ може приймати на } d \text{ значення } T\} = \{d \in {}^V A \mid T \in P[d]\},$
- $F(P) = \{d \in {}^V A \mid P \text{ може приймати на } d \text{ значення } F\} = \{d \in {}^V A \mid F \in P[d]\},$
- $\perp(P) = \{d \in {}^V A \mid P \text{ може бути невизначенім на } d\} = \{d \in {}^V A \mid \emptyset \in P[d]\}.$

Кожне $d \in {}^V A$ має належати принаймні одній з цих множин, тому їх пов'язує така загальна умова:

$$T(P) \cup F(P) \cup \perp(P) = {}^V A \quad (G)$$

Області істинності, хибності, невизначеності будемо також називати T -областю, F -областю, \perp -областю.

Множину $T(P) \cap F(P)$ назовемо *областю амбівалентності* GND-предиката P .

Для однозначного задання V - A -квазіарного R-предиката P достатньо 2-х множин: $T(P)$ та $F(P)$. При цьому

$$\perp(P) = \overline{T(P) \cup F(P)} \quad (R)$$

Кожний R-предикат P можна трактувати як GND-предикат, для якого маємо умову (R).

Можна виділити низку різноманітних класів GND-предикатів. При цьому має виконуватись умова (G).

V-*A*-квазіарний *GND*-предикат *P*:

- однозначний, або *SG*-предикат, якщо $T(P) \cap F(P) = \emptyset$;
- тотальний, або *TG*-предикат, якщо $T(P) \cup F(P) = {}^V A$;
- виконуваний, якщо $T(P) \neq \emptyset$;
- неспростовний, якщо $F(P) = \emptyset$;
- totally true, якщо $T(P) = {}^V A$;
- totally false, якщо $F(P) = {}^V A$;
- totally undefined, або *TIG*-предикат (with total class of indefinite values), якщо $\perp(P) = {}^V A$;
- totally ambivalent, або *TAmG*-предикат, якщо $T(P) = F(P) = {}^V A$.

TIG-предикати (в [10] названі *OIG*) дуже подібні до *R*-предикатів: кожний *TIG*-предикат, як і кожний *R*-предикат, цілком визначається тільки *T*-областю та *F*-областю. Для *R*-предиката *P* $\perp(P)$ детермінується $T(P)$ та $F(P)$ умовою (*R*), а для *TIG*-предиката *P* маємо $\perp(P) = {}^V A$, тому для нього істотні теж лише $T(P)$ та $F(P)$.

Клас *TAmG*-предикатів вироджений, такі предикати відрізняються лише \perp -областями.

Зрозуміло, що існують *SG*-предикати, які не є *R*-предикатами, та навпаки. Те ж саме для *TG*-предикатів. Поєднуючи (де це можливо) наведені вище умови з умовою (*R*), отримуємо низку класів *R*-предикатів.

V-*A*-квазіарний *GND*-предикат *P*:

- однозначний *R*-предикат, або *P*-предикат, якщо $T(P) \cap F(P) = \emptyset$ та $\perp(P) = \overline{T(P) \cup F(P)}$;
- тотальний *R*-предикат, або *T*-предикат, якщо $\perp(P) = \emptyset$ (умова (*G*) тоді дає $T(P) \cup F(P) = {}^V A$);
- неспростовний (частково істинний) *R*-предикат, якщо $F(P) = \emptyset$ та $\perp(P) = \overline{T(P)}$;
- totally false *R*-предикат, якщо $F(P) = {}^V A$ та $\perp(P) = \emptyset$;
- totally true *R*-предикат, якщо $T(P) = {}^V A$ та $\perp(P) = \emptyset$.

Поєднання відповідних умов дає, зокрема, такі важливі класи *GND*-предикатів:

- *TSG*-предикати (умови $T(P) \cap F(P) = \emptyset$ та $T(P) \cup F(P) = {}^V A$);
- *TS*-предикати (умови $T(P) \cap F(P) = \emptyset$, $T(P) \cup F(P) = {}^V A$ та $\perp(P) = \emptyset$);
- *STIG*-предикати (умови $\perp(P) = {}^V A$ та $T(P) \cap F(P) = \emptyset$);
- *TTIG*-предикати (умови $\perp(P) = {}^V A$ та $T(P) \cup F(P) = {}^V A$);
- *TSTIG*-предикати (умови $\perp(P) = {}^V A$, $T(P) \cap F(P) = \emptyset$ та $T(P) \cup F(P) = {}^V A$);

В класі *V*-*A*-квазіарних *GND*-предикатів можна виділити 7 константних. Предикат *P*:

- *totally true* (позн. *T*), якщо $F(P) = \perp(P) = \emptyset$ та $T(P) = {}^V A$;
- *totally false* (позн. *F*), якщо $T(P) = \perp(P) = \emptyset$ та $F(P) = {}^V A$;
- *totally undefined* (позн. *T₁*), якщо $T(P) = \perp(P) = {}^V A$ та $F(P) = \emptyset$;
- *totally false-undefined* (позн. *F₁*), якщо $F(P) = \perp(P) = {}^V A$ та $T(P) = \emptyset$;
- *totally false-true* (позн. *U*), якщо $T(P) = F(P) = \emptyset$ та $\perp(P) = {}^V A$;
- *totally true-undefined* (позн. *Y*), якщо $T(P) = F(P) = {}^V A$ та $\perp(P) = \emptyset$;
- *totally undefined-undefined* (позн. *U₁*), якщо $T(P) = F(P) = \perp(P) = {}^V A$.

При цьому *T*, *F*, \perp , *U* є константними *R*-предикатами.

Беручи до уваги області невизначеності та амбівалентності, можна виділити також низку спеціальних класів *GND*-предикатів, які не є *R*-предикатами, окрім вироджених випадків. *V*-*A*-квазіарний *GND*-предикат *P*:

-
- AU -предикат, якщо $T(P) \cap F(P) \subseteq \perp(P)$;
 - UA -предикат, якщо $\perp(P) \subseteq T(P) \cap F(P)$;
 - U_A -предикат, якщо $\perp(P) = T(P) \cap F(P)$;
 - nU_A -предикат, якщо $\overline{\perp(P)} = T(P) \cap F(P)$;
 - AnU -предикат, якщо $T(P) \cap F(P) \subseteq \overline{\perp(P)}$;
 - ImG -предикат (with imprecise values), якщо $\overline{\perp(P)} \subseteq T(P) \cap F(P)$.

Для кожного ImG -предиката P не існує даних на яких P приймає значення лише T або лише F .

Твердження 1. Для введених спеціальних класів GND -предикатів маємо такі властивості.

1. Неоднозначні AU -предикати не є R -предикатами; SG -предикати гарантовано є AU -предикатами.
2. За умови $\perp(P) = \emptyset$ кожний AU -предикат та кожний U_A -предикат стає TS -предикатом.
3. Кожний UA -предикат тотальний: $d \notin T(P) \cup F(P) \Rightarrow d \notin T(P) \cap F(P) \Rightarrow (UA) d \notin \perp(P) \Rightarrow$ суперечність $3(G)$.
4. Кожний U_A -предикат є UA -предикатом, тому кожний U_A -предикат – тотальний.
5. Тотальні R -предикати (T -предикати) є UA -предикатами.
6. Кожний UA -предикат та кожний U_A -предикат з умовою $\perp(P) \neq \emptyset$ не є R -предикатом.
7. Кожний R -предикат є AnU -предикатом: для R -предикатів $T(P) \cap F(P) \cap \perp(P) = \emptyset$, що дає AnU -умову.
8. Кожний SG -предикат є AnU -предикатом.
9. Для R -предикатів ImG -умова дає вироджений клас із умовою $T(P) = F(P)$.
10. Кожний TIG -предикат є ImG -предикатом; кожний $TAnG$ -предикат є ImG -предикатом.

Нехай $*$ – це назва одного із визначених вище класів GND -предикатів (напр., SG , TIG).

Відповідний клас V_A -квазіарних $*$ -предикатів позначаємо $*_{V_A}$ (напр., $PrSG_{V_A}$, $PrTIG_{V_A}$).

Твердження 2. Поєднуючи умови UA та U_A із умовою $T(P) \cup F(P) = {}^V A$, отримуємо (див пп. 3 та 4 твердження 1) ті ж самі класи тотальних предикатів: $PrUA_{V_A} = PrTUA_{V_A}$; $PrU_A_{V_A} = PrTU_A_{V_A}$.

Твердження 3. Поєднуючи умови AU , AnU , ImG , nU_A , UA , U_A із $T(P) \cap F(P) = \emptyset$, маємо відомі класи: $PrSAU_{V_A} = PrSAnU_{V_A} = PrSG_{V_A}$; $PrSImG_{V_A} = PrSnU_A_{V_A} = PrSTIG_{V_A}$; $PrSUA_{V_A} = PrSU_A_{V_A} = PrTS_{V_A}$.

Твердження 4. Поєднуючи умови AU , ImG , AnU , nU_A із умовою $T(P) \cup F(P) = {}^V A$, отримуємо нові класи тотальних предикатів: $PrTAU_{V_A}$, $PrTImG_{V_A}$, $PrTAnU_{V_A}$, $PrTnU_A_{V_A}$.

2. Композиції GND -предикатів

Композиції квазіарних GND -предикатів як засоби побудови складніших предикатів із простіших мають враховувати особливості недетермінованих предикатів. Пропозиційні композиції (логічні зв'язки) задаємо через області істинності, хибності та невизначеності відповідних предикатів.

Для композиції заперечення \neg маємо:

$$T(\neg P) = F(P), \quad F(\neg P) = T(P), \quad \perp(\neg P) = \perp(P).$$

При визначенні диз'юнкції \vee беремо до уваги таке: $P \vee Q$ невизначений на $d \Leftrightarrow P$ та Q невизначені на d або P невизначений на d та Q хибний на d або Q невизначений на d та P хибний на d . Тому задаємо:

$$T(P \vee Q) = T(P) \cup T(Q), \quad F(P \vee Q) = F(P) \cap F(Q),$$

$$\perp(P \vee Q) = (\perp(P) \cap \perp(Q)) \cup (\perp(P) \cap F(Q)) \cup (F(P) \cap \perp(Q)).$$

Композиції \neg та \vee – це базові пропозиційні композиції GND -предикатів.

Композиції \rightarrow та $\&$ є похідними, вони задаються через \vee та \neg : $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$; $P \& Q = \neg(\neg P \vee Q)$.

Звідси, зокрема, для кон'юнкції отримуємо: $\perp(P \& Q) = (\perp(P) \cap \perp(Q)) \cup (\perp(P) \cap T(Q)) \cup (T(P) \cap \perp(Q))$.

Це узгоджується із такою природною умовою для кон'юнкції: $P \& Q$ невизначений на $d \Leftrightarrow P$ та Q невизначені на d або P невизначений на d та Q невизначений на d та P істинний на d .

Твердження 5. Безпосередньо із визначень отримуємо [10] такі співвідношення:

$$\begin{aligned} - T(P \vee Q) \cup \perp(P \vee Q) &= T(P) \cup \perp(P) \cup T(Q) \cup \perp(Q); \quad F(P \vee Q) \cup \perp(P \vee Q) = (F(P) \cup \perp(P)) \cap (F(Q) \cup \perp(Q)); \\ - F(P \& Q) \cup \perp(P \& Q) &= F(P) \cup \perp(P) \cup F(Q) \cup \perp(Q); \quad T(P \& Q) \cup \perp(P \& Q) = (T(P) \cup \perp(P)) \cap (T(Q) \cup \perp(Q)). \end{aligned}$$

Покажемо тепер *коректність* так визначених композицій \vee та \neg для GND-предикатів. Це означає, що \vee та \neg мають зберігати умову (G).

Теорема 1. Якщо для GND-предикатів P та Q виконується умова (G) то вона виконується для $\neg P$ та $P \vee Q$.

Для \neg маємо: $F(\neg P) \cup T(\neg P) \cup \perp(\neg P) = T(P) \cup F(P) \cup \perp(P) = {}^V A$. Покажемо, що \vee зберігає умову (G).

Маємо $T(P) \cup F(P) \cup \perp(P) = {}^V A$ та $T(Q) \cup F(Q) \cup \perp(Q) = {}^V A$. Треба довести: $T(P \vee Q) \cup F(P \vee Q) \cup \perp(P \vee Q) = {}^V A$.

Нехай супротивне: маємо умови (G) для P та Q , проте (G) невірна для $P \vee Q$. Останнє означає: для деякого $d \in {}^V A$ маємо $d \notin T(P \vee Q) \cup F(P \vee Q) \cup \perp(P \vee Q)$, звідки $d \notin F(P \vee Q) \cup \perp(P \vee Q)$ та $d \notin T(P \vee Q)$. Згідно твердження 5 звідси маємо $(d \notin (F(P) \cup \perp(P)) \cap (F(Q) \cup \perp(Q)))$ та $d \notin T(P) \cup T(Q) \Leftrightarrow (d \notin F(P) \cup \perp(P))$ та $d \notin T(P) \cup T(Q)$ або $(d \notin F(Q) \cup \perp(Q))$ та $d \notin T(P) \cup T(Q) \Leftrightarrow (d \notin F(P), d \notin \perp(P), d \notin T(P), d \notin T(Q))$ або $(d \notin F(Q), d \notin \perp(Q), d \notin T(P), d \notin T(Q) \Leftrightarrow (d \notin F(P) \cup \perp(P) \cup T(P))$ та $d \notin T(Q))$ або $(d \notin F(Q) \cup \perp(Q) \cup T(Q))$ та $d \notin T(P))$. Перша умова суперечить умові (G) для P , друга – умові (G) для Q . Отримали суперечність, що й доводить збереження композицію \vee умови (G).

$$\begin{aligned} \text{Tвердження 6. } \perp(P \vee (Q \vee S)) &= \perp((P \vee Q) \vee S) = (F(P) \cap F(Q) \cap \perp(S)) \cup (F(P) \cap \perp(Q) \cap F(S)) \cup \\ &\cup (\perp(P) \cap F(Q) \cap F(S)) \cup (F(P) \cap \perp(Q) \cap \perp(S)) \cup (\perp(P) \cap F(Q) \cap \perp(S)) \cup (\perp(P) \cap \perp(Q) \cap F(S)) \cup (\perp(P) \cap \perp(Q) \cap \perp(S)); \\ \perp(P \& (Q \& S)) &= \perp((P \& Q) \& S) = (T(P) \cap T(Q) \cap \perp(S)) \cup (T(P) \cap \perp(Q) \cap T(S)) \cup (\perp(P) \cap T(Q) \cap T(S)) \cup \\ &\cup (T(P) \cap \perp(Q) \cap \perp(S)) \cup (\perp(P) \cap T(Q) \cap \perp(S)) \cup (\perp(P) \cap \perp(Q) \cap T(S)) \cup (\perp(P) \cap \perp(Q) \cap \perp(S)). \end{aligned}$$

Подібним чином можна задати \perp -області для диз'юнкції та кон'юнкції 4-х і більше предикатів.

Теорема 2. Для GND-предикатів виконуються такі закони традиційної логіки.

- 1) Комутативність \vee та $\&$: $P \vee Q = Q \vee P$; $P \& Q = Q \& P$.
- 2) Асоціативність \vee та $\&$ (випливає з твердження 6): $(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$; $(P \& Q) \& R = P \& (Q \& R)$.
- 3) Зняття подвійного заперечення: $\neg\neg P = P$.
- 4) Ідемпотентність \vee та $\&$: $P = P \vee P$; $P = P \& P$.
- 5) Закони де Моргана: $\neg(P \vee Q) = \neg P \& \neg Q$; $\neg(P \& Q) = \neg P \vee \neg Q$.

Приклад 1 (див. [10]). Маємо $T(P \& Q \vee P) = T((P \vee Q) \& P) = T(P)$, $F(P \& Q \vee P) = F((P \vee Q) \& P) = F(P)$; водночас $\perp(P \& Q \vee P) = \perp((P \vee Q) \& P) = \perp(P) \cup (F(P) \cap T(P) \cap \perp(Q))$.

Це можна трактувати так: при ускладненні опису предиката зростає невизначеність його функціонування (наростає “ентропія” опису). При переході від простого опису предиката P до складнішого із залученням Q до цього опису, до \perp -області $\perp(P)$ додається компонента $F(P) \cap T(P) \cap \perp(Q)$, яка може бути $\neq \emptyset$.

Таким чином, предикати P , $(P \vee Q) \& P$, $P \& Q \vee P$ збігаються в класі R -предикатів, водночас предикати $(P \vee Q) \& P$ та $P \& Q \vee P$ збігаються в класі GND-предикатів, проте вони не збігаються із P .

Приклад 2. Маємо $\perp((P \& R) \vee (Q \& R)) = \perp((P \vee Q) \& R) \cup ((\perp(P) \cup \perp(Q)) \cap F(R) \cap T(R))$.

Тут маємо $\perp((P \vee Q) \& R) = (T(P) \cap \perp(R)) \cup (\perp(P) \cap \perp(R)) \cup (T(Q) \cap \perp(R)) \cup (\perp(Q) \cap \perp(R)) \cup (F(P) \cap \perp(Q) \cap T(R)) \cup (\perp(P) \cap F(Q) \cap T(R)) \cup (\perp(P) \cap \perp(Q) \cap T(R))$. І ці подання отримуємо на основі визначення та твердження 5.

Приклад 3. Візьмемо $d \in {}^V A$ таке: $d \in \perp(P)$, $d \notin \perp(Q)$, $d \notin F(Q)$, $d \notin \perp(R)$, $d \in F(R)$, $d \in T(R)$.

Маємо $d \in \perp(P) \cap F(R) \cap T(R)$, звідки $d \in (\perp(P) \cup \perp(Q)) \cap F(R) \cap T(R)$, тому $d \in \perp((P \& R) \vee (Q \& R))$.

Водночас із умов $d \notin \perp(R)$, $d \notin \perp(Q)$ та $d \notin F(Q)$ згідно прикладу 2 отримуємо $d \notin \perp((P \vee Q) \& R)$.

Ми отримали, що предикати $(P \vee Q) \& R$ та $(P \& R) \vee (Q \& R)$ не збігаються в класі GND-предикатів, проте вони збігаються в класі R-предикатів. Таким чином, приклади 1 – 3 засвідчують наступне.

Теорема 3. Для GND-предикатів не виконуються такі важливі закони традиційної логіки:

- закони поглинання для \vee та $\&$;
- закони дистрибутивності для \vee та $\&$.

Теорема 4. Пропозиційні композиції GND-предикатів виводять за межі R-предикатів.

Нехай R-предикат \tilde{P} є дуальним [6] до R-предиката P . Це означає: $T(\tilde{P}) = \overline{F(P)}$, $F(\tilde{P}) = \overline{T(P)}$.

Для R-предикатів P та \tilde{P} маємо: $\perp(P) = \overline{T(P) \cup F(P)} = \overline{T(P)} \cap \overline{F(P)}$, $\perp(\tilde{P}) = \overline{\overline{F(P)} \cup \overline{T(P)}} = F(P) \cap T(P)$;

$T(P \vee \tilde{P}) \cup F(P \vee \tilde{P}) = T(P) \cup \overline{F(P)} \cup (F(P) \cap \overline{T(P)}) = {}^V A$, $T(P \vee \tilde{P}) \cap F(P \vee \tilde{P}) = (T(P) \cup \overline{F(P)}) \cap F(P) \cap \overline{T(P)} = \emptyset$;

$T(P \& \tilde{P}) \cup F(P \& \tilde{P}) = (T(P) \cap \overline{F(P)}) \cup F(P) \cup \overline{T(P)} = {}^V A$, $T(P \& \tilde{P}) \cap F(P \& \tilde{P}) = T(P) \cap \overline{F(P)} \cap (F(P) \cup \overline{T(P)}) = \emptyset$.

Отже, як R-предикати $P \vee \tilde{P}$ та $P \& \tilde{P}$ є TS-предикатами [6], для них \perp -області – це \emptyset .

Тепер потрактуємо $P \vee \tilde{P}$ та $P \& \tilde{P}$ як GND-предикати. \perp -області таких GND-предикатів:

$\perp(P \vee \tilde{P}) = (\perp(P) \cap \perp(\tilde{P})) \cup (\perp(P) \cap F(\tilde{P})) \cup (F(P) \cap \perp(\tilde{P})) = (\overline{T(P)} \cap \overline{F(P)}) \cup (F(P) \cap T(P)) = \perp(P) \cup \perp(\tilde{P})$;

$\perp(P \& \tilde{P}) = (\perp(P) \cap \perp(\tilde{P})) \cup (\perp(P) \cap T(\tilde{P})) \cup (T(P) \cap \perp(\tilde{P})) = (\overline{T(P)} \cap \overline{F(P)}) \cup (F(P) \cap T(P)) = \perp(P) \cup \perp(\tilde{P})$.

Нехай R-предикат P такий: $F(P) \cap T(P) \neq \emptyset$ або $\overline{T(P)} \cap \overline{F(P)} \neq \emptyset$. Тоді $\perp(P \vee \tilde{P}) \neq \emptyset$ та $\perp(P \& \tilde{P}) \neq \emptyset$.

Отже, $P \vee \tilde{P}$ та $P \& \tilde{P}$ вже не є R-предикатами.

Наведемо ще один приклад на підтвердження теореми 4.

Приклад 4. Нехай R-предикат P такий, що $F(P) \cap T(P) \neq \emptyset$; тоді $P \& \tilde{P} \vee P$ не є R-предикатом.

Композицію реномінації $R_{\bar{x}}^{\bar{v}} : PrG_{V-A} \circledast PrG_{V-A}$ для GND-предикатів задаємо так, як і для R-предикатів:

$R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)[d] = P[r_{\bar{x}}^{\bar{v}}(d)]$ для кожного $d \in {}^V A$; тут $r_{\bar{x}}^{\bar{v}} : {}^V A \circledast {}^V A$ – операція реномінації IM (див. [6]).

Композицію $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}$ можна визначити через T -область, F -область, \perp -область відповідного предиката $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)$:

$T(R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)) = \{d \in {}^V A \mid r_{\bar{x}}^{\bar{v}}(d) \in T(P)\}$; $F(R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)) = \{d \in {}^V A \mid r_{\bar{x}}^{\bar{v}}(d) \in F(P)\}$; $\perp(R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)) = \{d \in {}^V A \mid r_{\bar{x}}^{\bar{v}}(d) \in \perp(P)\}$.

Основні властивості композицій реномінації для GND-предикатів такі ж як (див. [3, 6]) для R-предикатів.

R) $R(P) = P$ – тотожна реномінація; композиція R без параметрів діє як тотожне відображення.

RI) $R_{z,\bar{x}}^{z,\bar{v}}(P) = R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)$ – згортка тотожної пари імен у реномінації;

RU) $R_{y,\bar{x}}^{z,\bar{v}}(P) = R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)$, якщо z неістотне [3, 6] для P , – згортка пари імен з неістотним верхнім іменем;

RR) $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(R_{\bar{y}}^{\bar{w}}(P)) = R_{\bar{x}}^{\bar{v}} \circ_{\bar{y}}^{\bar{w}}(P)$; тут $R_{\bar{x}}^{\bar{v}} \circ_{\bar{y}}^{\bar{w}}$ – згортка [3, 6] композицій реномінації $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}$ та $R_{\bar{y}}^{\bar{w}}$;

R \neg) $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\neg P) = \neg R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)$ – R \neg -дистрибутивність;

R \vee) $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P \vee Q) = R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P) \vee R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(Q)$ – R \vee -дистрибутивність.

Опишемо композиції квантифікації $\exists x: PrG_{V-A} \circledast PrG_{V-A}$ та $\forall x: PrG_{V-A} \circledast PrG_{V-A}$.

Задаємо предикат $\exists xP$ через його області істинності, хибності та невизначеності.

$$T(\exists xP) = \{d \in {}^V A \mid d \nabla x \mapsto a \in T(P) \text{ для деякого } a \in A\}; \quad F(\exists xP) = \{d \in {}^V A \mid d \nabla x \mapsto a \in F(P) \text{ для всіх } a \in A\};$$

$$\perp(\exists xP) = \{d \in {}^V A \mid d \nabla x \mapsto a \in \perp(P) \cup F(P) \text{ для всіх } a \in A \text{ та } d \nabla x \mapsto b \in \perp(P) \text{ для деякого } b \in A\}.$$

Композицію $\exists x$ віднесемо її до базових. Композиція $\forall x$ є похідною, її задаємо традиційно: $\forall xP = \neg \exists x \neg P$.

Твердження 7 (див. [10]). $d \in \perp(\exists xP) \cup T(\exists xP) \Leftrightarrow d \nabla x \mapsto b \in T(P) \cup \perp(P) \text{ для деякого } b \in A$;

$$d \in \perp(\exists xP) \cup F(\exists xP) \Leftrightarrow d \nabla x \mapsto a \in F(P) \cup \perp(P) \text{ для всіх } a \in A.$$

Основні властивості композицій квантифікації *GND*-предикатів такі ж, як (див. [3, 6]) для *R*-предикатів.

1. Комувативність однотипних кванторів: $\exists x \exists y P = \exists y \exists x P$; $\forall x \forall y P = \forall y \forall x P$.

2. Закони де Моргана для кванторів: $\neg \exists x P = \forall x \neg P$; $\neg \forall x P = \exists x \neg P$.

3. Неістотність квантифікованих імен: $\exists x \exists x P = \exists x P$; $\exists x \forall x P = \forall x P$; $\forall x \exists x P = \exists x P$; $\forall x \forall x P = \forall x P$.

4. Дистрибутивність кванторів щодо \vee та $\&$: $\exists x P \vee \exists x Q = \exists x (P \vee Q)$; $\forall x P \& \forall x Q = \forall x (P \& Q)$.

Наведемо властивості $\exists x$, пов'язані з реномінацією; відповідні властивості $\forall x$ записуються аналогічно.

$$R \exists R) R^{\bar{v},x}(\exists x P) = R^{\bar{v}}(\exists x P).$$

Ren) $\exists y P = \exists z R_z^y(P)$ за умови z неістотне для P – перейменування кванторного імені.

Rs) $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\exists y P) = \exists y R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(P)$ за умови $y \notin \{\bar{v}, \bar{x}\}$ – проста (обмежена) R \exists -дистрибутивність.

R \exists) $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\exists y P) = \exists z R_{\bar{x}}^{\bar{v}} \circ_z^y (P)$ за умови неістотне для P та $z \notin \{\bar{v}, \bar{x}\}$ – R \exists -дистрибутивність.

Для опису властивостей елімінації кванторів використовують [6] спеціальні предикати-індикатори Ez наявності в даних компонентах з відповідним $z \in V$. На рівні *GND*-предикатів такі Ez задаємо наступним чином:

$$T(Ez) = \{d \mid d(z) \downarrow\}, \quad F(Ez) = \{d \mid d(z) \uparrow\}, \quad \perp(Ez) = \emptyset.$$

Таким чином, предикати-індикатори Ez тотальні та однозначні, вони є *TS*-предикатами.

Твердження 8. Для кожного $9 \in PrG_{V-A}$: $\perp(9 \vee Ez) = \perp(9) \cap F(Ez) \subseteq \perp(9)$; $\perp(9 \& Ez) = \perp(9) \cap T(Ez) \subseteq \perp(9)$;

$$\perp(9 \vee Ez) \cup T(9 \vee Ez) = \perp(9) \cup T(9) \cup T(Ez) \supseteq \perp(9) \cup T(9); \quad \perp(9 \& Ez) \cup F(9 \& Ez) = \perp(9) \cup F(9) \cup F(Ez) \supseteq \perp(9) \cup F(9).$$

Композиції \neg , \vee , $R_{\bar{x}}^{\bar{v}}$, $\exists x$ – це базові композиції чистих першопорядкових логік *GND*-предикатів.

3. Композиційні алгебри *GND*-предикатів

Композиційну алгебру $AQG_{V-A} = (PrG_{V-A}, CQ)$, де $CQ = \{\neg, \vee, R_{\bar{x}}^{\bar{v}}, \exists x\}$ – множина базових композицій, назовемо чистою першопорядковою алгеброю *GND*-предикатів.

Композиційну алгебру $ARG_{V-A} = (PrG_{V-A}, CR)$, де $CR = \{\neg, \vee, R_{\bar{x}}^{\bar{v}}\}$ – множина базових композицій, назовемо реномінативною алгеброю *GND*-предикатів, або алгеброю *GND*-предикатів реномінативного рівня.

Композиційну алгебру $APG_{V-A} = (PrG_{V-A}, CP)$, де $CP = \{\neg, \vee\}$ – множина базових композицій, назовемо пропозиційною алгеброю *GND*-предикатів, або алгеброю *GND*-предикатів пропозиційного рівня.

З'язок *GND*-предикатів та 7-значних тотальних детермінованих предикатів, або *TD7*-предикатів, досліджено в [10]. Описано низку підалгебр алгебри APG_{V-A} , індукованих підалгебрами алгебри *TD7*-предикатів $ATD7_{V-A} = (PrTD7_{V-A}, \{\neg_*, \vee_*\})$. Ці підалгебри в свою чергу індукуються відповідними підалгебрами алгебри істиннісних значень $ATV_7 = (TV_7, \{\neg_*, \vee_*\})$, де $TV_7 = \{\uparrow, T, F, TF, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$.

Подібним чином підалгебри алгебри ATV_7 індукують відповідні підалгебри реномінативної алгебри ARG_{V-A} та підалгебри першопорядкової алгебри AQG_{V-A} . Назви таких підалгебр формуємо із вказівки рівня розгляду та назви класу GND -предикатів. Наприклад, $AQSG_{V-A}$ – алгебра SG -предикатів кванторного рівня.

Композиції \neg_* та \vee_* для 7-значних предикатів задаються [10] за допомогою таблиць істинності (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Композиція \neg_*

P	T	F	TF	\uparrow	$T\uparrow$	$F\uparrow$	$TF\uparrow$
$\neg_* P$	F	T	TF	\uparrow	$F\uparrow$	$T\uparrow$	$TF\uparrow$

Таблиця 2. Композиція \vee_*

\vee_*	T	F	TF	\uparrow	$T\uparrow$	$F\uparrow$	$TF\uparrow$
T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	TF	\uparrow	$T\uparrow$	$F\uparrow$	$TF\uparrow$
TF	T	TF	TF	$T\uparrow$	$T\uparrow$	$TF\uparrow$	$TF\uparrow$
\uparrow	T	\uparrow	$T\uparrow$	\uparrow	$T\uparrow$	\uparrow	$T\uparrow$
$T\uparrow$	T	$T\uparrow$	$T\uparrow$	$T\uparrow$	$T\uparrow$	$T\uparrow$	$T\uparrow$
$F\uparrow$	T	$F\uparrow$	$TF\uparrow$	\uparrow	$T\uparrow$	$F\uparrow$	$TF\uparrow$
$TF\uparrow$	T	$TF\uparrow$	$TF\uparrow$	$T\uparrow$	$T\uparrow$	$TF\uparrow$	$TF\uparrow$

Похідні композиції \rightarrow_* та $\&_*$ виражаються через \neg_* та \vee_* : $P \rightarrow_* Q = \neg P \vee_* Q$; $P \&_* Q = \neg_*(\neg_* P \vee_* Q)$.

Зв'язок алгебр ATV_7 та APG_{V-A} встановлюється [10] так. Наявність певного істиннісного значення v в TV_7 означає, що існують предикат $P \in PrG_{V-A}$ та $d \in {}^V A$ такі, що $v \in P[d]$.

Для опису підалгебр ATV_7 виділено [10] усі підмножини множини TV_7 , замкнені щодо $\{\neg_*, \vee_*\}$:

6-елементні $TV_{6_1} = \{\uparrow, T, F, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$ та $TV_{6_2} = \{T, F, TF, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$;

5-елементні $TV_{5_1} = \{\uparrow, T, F, T\uparrow, F\uparrow\}$, $TV_{5_2} = \{T, F, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$, $TV_{5_3} = \{\uparrow, T\uparrow, F\uparrow, TF, TF\uparrow\}$;

4-елементні $TV_{4_1} = \{T, F, T\uparrow, F\uparrow\}$, $TV_{4_2} = \{T, F, TF, TF\uparrow\}$, $TV_{4_3} = \{TF, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$; $TV_{4_4} = \{\uparrow, T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$;

3-елементні $TV_{3_1} = \{T, F, \uparrow\}$, $TV_{3_2} = \{T, F, TF\}$, $TV_{3_3} = \{T, F, TF\uparrow\}$, $TV_{3_4} = \{T\uparrow, F\uparrow, TF\uparrow\}$, $TV_{3_5} = \{\uparrow, T\uparrow, F\uparrow\}$;

2-елементні $TV_{2_1} = \{T, F\}$, $TV_{2_2} = \{T\uparrow, F\uparrow\}$, $TV_{2_3} = \{TF, TF\uparrow\}$;

1-елементні $TV_{1_1} = \{\uparrow\}$, $TV_{1_2} = \{TF\}$, $TV_{1_3} = \{TF\uparrow\}$.

Ці підмножини TV_{m_n} задають відповідні підалгебри ATV_{m_n} алгебри ATV_7 . Далі ці підалгебри індукують відповідні підалгебри алгебри $ATD7_{V-A}$, які в свою чергу індукують наступні підалгебри алгебри AQG_{V-A} :

$AQAU_{V-A}, AQTG_{V-A};$

$AQSG_{V-A}, AQTAU_{V-A}, AQImG_{V-A};$

$AQTSG_{V-A}, AQTUA_{V-A}, AQTImG_{V-A}, AQTIG_{V-A};$

$AQP_{V-A}, AQT_{V-A}, AQTU_{V-A}, AQTIG_{V-A}, AQSTIG_{V-A};$

$AQTS_{V-A}, AQTSTIG_{V-A}, AQTAmG_{V-A};$

$AQ\perp_{V-A}, AQY_{V-A}, AQY\perp_{V-A}.$

Підалгебри ATV_{m_n} подібним чином індукують відповідні підалгебри алгебри APG_{V-A} та алгебри ARG_{V-A} :

Не всі описані класи GND -предикатів замкнені щодо введеної вище композиції \vee . Це, зокрема, клас R -предикатів та специфічні класи nU_A -предикатів, AnU -предикатів, TnU_A -предикатів, $TAnU$ -предикатів. Цим класам зіставлено класи $TD7$ -предикатів, для яких множинами істиннісних значень є відповідно $\{T, F, \uparrow, TF\}$,

$\{\uparrow, T\uparrow, F\uparrow, TF\}, \{T, F, \uparrow, T\uparrow, F\uparrow, TF\}, \{T\uparrow, F\uparrow, TF\}, \{T, F, T\uparrow, F\uparrow, TF\}$; ці множини незамкнені щодо \vee_* .

Опишемо відношення між виділеними підалгебрами алгебри AQG_{V-A} .

Пишемо $A \prec B$, якщо A є підалгеброю B . Те, що алгебри A та B ізоморфні, позначаємо $A \sim_i B$.

Теорема 5. Маємо наступні співвідношення:

$$AQAU_{V-A}, AQTG_{V-A} \prec AQG_{V-A};$$

$$AQSG_{V-A}, AQTAU_{V-A} \prec AQAU_{V-A}; \quad AQTAU_{V-A} \prec AQTG_{V-A}; \quad AQImG_{V-A} \prec AQG_{V-A}; \quad AQSG_{V-A} \sim_i AQTAU_{V-A};$$

$$AQTSG_{V-A} \prec AQSG_{V-A}, AQTAU_{V-A}; \quad AQTUA_{V-A}, AQTImG_{V-A} \prec AQTG_{V-A}; \quad AQTIG_{V-A} \prec AQAU_{V-A}; \\ AQTIG_{V-A}, AQTImG_{V-A} \prec AQImG_{V-A};$$

$$AQP_{V-A} \prec AQSG_{V-A}; \quad AQT_{V-A}, AQTU_{=A_{V-A}} \prec AQTUA_{V-A}; \quad AQTIG_{V-A}, AQTU_{=A_{V-A}} \prec AQTAU_{V-A}; \\ AQTIG_{V-A} \prec AQTImG_{V-A}, AQTIG_{V-A}; \quad AQSTIG_{V-A} \prec AQSG_{V-A}, AQTIG_{V-A}; \\ AQP_{V-A} \sim_i AQT_{V-A} \sim_i AQTU_{=A_{V-A}} \sim_i AQTIG_{V-A} \sim_i AQSTIG_{V-A};$$

$$AQTS_{V-A} \prec AQP_{V-A}, AQT_{V-A}, AQTSG_{V-A}, AQTU_{=A_{V-A}}; \quad AQTSTIG_{V-A} \prec AQTIG_{V-A}, AQSTIG_{V-A}, AQTSG_{V-A}; \\ AQTAmG_{V-A} \prec AQTUA_{V-A}, AQTImG_{V-A}; \quad AQTS_{V-A} \sim_i AQTSTIG_{V-A}; \\ A Q \perp_{V-A} \prec AQP_{V-A}, AQSTIG_{V-A}; \quad A Q \Upsilon_{V-A} \prec AQTAmG_{V-A}, AQT_{V-A}; \\ A Q \Upsilon \perp_{V-A} \prec AQTAmG_{V-A}, AQTU_{=AG_{V-A}}, AQTIG_{V-A}; \quad A Q \perp_{V-A} \sim_i A Q \Upsilon_{V-A} \sim_i A Q \Upsilon \perp_{V-A}.$$

Чиста першопорядкова алгебра R -предикатів AQR_{V-A} не індукована жодною підалгеброю алгебри TV_7 , але вона є *вкладенням* в алгебри $AQImG_{V-A}$ та $AQAU_{V-A}$; при цьому $AQR_{V-A} \sim_i AQTIG_{V-A}$.

Аналогічні відношення є між відповідними підалгебрами алгебри APG_{V-A} та ARG_{V-A} .

Виділеним підалгебрам алгебри $ATV7$ відповідають *сингулярні* алгебри GND -предикатів, носії яких складені з константних предикатів $T, F, \perp, T_\uparrow, F_\uparrow, \Upsilon, \Upsilon_\uparrow$. Зокрема, це 1-елементні алгебри $\perp^Q_{V-A}, \Upsilon^Q_{V-A}, \Upsilon\uparrow^Q_{V-A}$.

4. Мови чистих першопорядкових логік GND -предикатів

Мови чистих першопорядкових логік GND -предикатів із синтаксичного погляду ідентичні відомим [2, 3] мовам ЧКНЛ. Алфавіт мови: множини $Cs = \{\neg, \vee, R_{\bar{x}}^{\bar{y}}, \exists x\}$ символів базових композицій; множина V предметних імен (змінних), в якій виділена множина $U \subseteq V$ тотально неістотних імен; множина Ps предикатних символів.

Визначення множини Fr формул: $Ps \subseteq Fr; \Phi, \Psi \in Fr \Rightarrow \neg\Phi, \vee\Phi\Psi, R_{\bar{x}}^{\bar{y}}\Phi, \exists x\Phi \in Fr$.

Для запису формул використовуємо префіксну форму запису. Для зручності вживаемо [2] скорочення формул, користуючись символами похідних композицій та інфіксною формою запису для бінарних композицій.

В логіці GND -предикатів клас інтерпретацій істотно ширший порівнянно з логікою R -предикатів. Інтерпретуємо мову на композиційних системах вигляду $CS = (A, PrG_{V-A}, CQ)$. Символи Cs позначають відповідні композиції, імена $x \in V$ – елементи множини A . Символи Ps позначають базові предикати в PrG_{V-A} , для його опису задамо тотальне однозначне відображення $I : Ps \circledast PrG_{V-A}$, яке розширимо до відображення інтерпретації формул $I : Fr \circledast PrG_{V-A}$ так:

$$I(\neg\Phi) = \neg(I(\Phi)), \quad I(\vee\Phi\Psi) = \vee(I(\Phi), I(\Psi)), \quad I(R_{\bar{x}}^{\bar{y}}\Phi) = R_{\bar{x}}^{\bar{y}}(I(\Phi)); \quad I(\exists x\Phi) = \exists x(I(\Phi)).$$

Трійки $J = (CS, \Sigma, I)$ – це *інтерпретації* мови сигнатури $\Sigma = (V, U, Cs, Ps)$. Скорочено їх позначаємо (A, I) .

Предикат $J(\Phi)$ – значення формули Φ при інтерпретації J – позначимо Φ_J .

Виділення класів GND -предикатів та відповідних підалгебр алгебри AQG_{V-A} виділяє класи інтерпретацій GND -предикатів. Тому маємо загальний клас G -інтерпретацій та низку підкласів цього класу. Такі класи інтерпретацій називають семантиками. Таким чином, можна говорити про загальну G -семантику

та, зокрема, про семантику AU , TG , SG , TAU , ImG , TSG , TAU , $TImG$, TIG , P , T , TU_A , $TTIG$, $STIG$, TS , $TSTIG$, $TAmG$.

Відому R -семантику можна трактувати як “вкладення” в G -семантику. Якщо “абстрагуватись” від областей невизначеності предикатів, явно їх не виділяючи, то властивості R -предикатів аналогічні властивостям TIG -предикатів, що засвідчує ізоморфізм алгебр AQR_{V-A} та $AQTIG_{V-A}$. При цьому для TIG -предикатів $\perp(P) = {}^V A$, а для R -предикатів $\perp(P) = \overline{T(P) \cup F(P)}$. В обох випадках область невизначеності окремої ролі не грає.

Логіки $*$ -предикатів назовемо логіками з $*$ -семантикою ($*$ – один з визначених вище класів предикатів).

Далі зосередимося на вивчені загального класу логік із G -семантикою та логік із SG -семантикою.

Відношення логічного наслідку в логіці GND -предикатів описане в [10]. Нагадаємо відповідні визначення.

Відношення G -наслідку $J\models_G$ для двох формул при фіксованій інтерпретації J задаємо так:

$$\Phi \models_J \Psi \Leftrightarrow T(\Phi_J) \subseteq T(\Psi_J) \text{ та } F(\Psi_J) \subseteq F(\Phi_J) \text{ та } \perp(\Phi_J) \subseteq \perp(\Psi_J) \cup T(\Psi_J) \text{ та } \perp(\Psi_J) \subseteq \perp(\Phi_J) \cup F(\Phi_J).$$

Неформально те, що Ψ_J є наслідком Φ_J означає: при переході від Φ_J до Ψ_J істинність може лише збільшитися, а хибність лише зменшитися, невизначеність переходить у невизначеність або істинність, у невизначеність переходить невизначеність або хибність.

Відношення логічного G -наслідку $|=_G$ визначаємо так: $\Phi |=_G \Psi$, якщо $\Phi \models_J \Psi$ для кожної інтерпретації J .

Відношення логічного SG -наслідку ${}^{SG}|=_G$ задаємо так: $\Phi {}^{SG}|=_G \Psi$, якщо $\Phi \models_J \Psi$ для кожної $J \in SG$.

Відношення $J\models_G$ рефлексивне й транзитивне [10]. Тому $|=_G$ та ${}^{SG}|=_G$ теж рефлексивні й транзитивні.

Для відношення $J\models_G$ справджується [10] закон контрапозиції: $\Phi \models_J \Psi \Leftrightarrow \neg \Psi \models_J \neg \Phi$. Звідси:

Твердження 9. $\Phi |=_G \Psi \Leftrightarrow \neg \Psi |=_G \neg \Phi$; $\Phi {}^{SG}|=_G \Psi \Leftrightarrow \neg \Psi {}^{SG}|=_G \neg \Phi$.

Відношення G -еквівалентності при інтерпретації J визначаємо так: $\Phi \sim_G \Psi$, якщо $\Phi \models_J \Psi$ та $\Psi \models_J \Phi$.

Відношення логічної G -еквівалентності визначаємо так: $\Phi \sim_G \Psi$, якщо $\Phi |=_G \Psi$ та $\Psi |=_G \Phi$.

Відношення логічної SG -еквівалентності визначаємо так: $\Phi {}^{SG} \sim_G \Psi$, якщо $\Phi {}^{SG}|=_G \Psi$ та $\Psi {}^{SG}|=_G \Phi$.

Твердження 10. $\Phi \sim_G \Psi \Leftrightarrow \Phi \sim_G \Psi$ для кожної інтерпретації J ; $\Phi {}^{SG} \sim_G \Psi \Leftrightarrow \Phi \sim_G \Psi$ для кожної $J \in SG$.

Для логіки GND -предикатів умова $\Phi \sim_G \Psi$ не означає повну збіжність предикатів Φ_J та Ψ_J . Справді, якщо $\Phi \sim_G \Psi$, то $T(\Phi_J) = T(\Psi_J)$ та $F(\Phi_J) = F(\Psi_J)$, позначимо ці множини як T та F . При цьому $\perp(\Phi_J)$ та $\perp(\Psi_J)$ можуть відрізнятися, проте [10] лише в $T \cap F$. Приклад такої відмінності – $\perp(\Phi_J)$ та $\perp(\Phi_J \& \Psi_J \vee \Phi_J)$. При цьому $\Phi |=_G \Phi \& \Psi \vee \Phi$ та $\Phi \sim_G (\Phi \vee \Psi) \& \Phi$ (див. [10]). Водночас ситуація нормалізується для логіки SG -предикатів.

Для SG -предикатів завжди $T(\Phi_J) \cap F(\Phi_J) = \emptyset$, тому $\Phi {}^{SG} \sim_G \Psi$ означає повну збіжність предикатів Φ_J та Ψ_J .

В [10] показано монотонність відношення $J\models_G$: $\Phi \models_J \Psi \Rightarrow \Phi \& A \models_J \Psi \vee B$.

Звідси монотонність відношень $|=_G$ та ${}^{SG}|=_G$: $\Phi |=_G \Psi \Rightarrow \Phi \& A |=_G \Psi \vee B$; $\Phi {}^{SG}|=_G \Psi \Rightarrow \Phi \& A {}^{SG}|=_G \Psi \vee B$.

Теорема 6 (еквівалентності). Нехай Φ' отримана з Φ заміною деяких входжень Φ_1, \dots, Φ_n на Ψ_1, \dots, Ψ_n .

1) Якщо $\Phi_1 \sim_G \Psi_1, \dots, \Phi_n \sim_G \Psi_n$, то $\Phi \sim_G \Phi'$; 2) Якщо $\Phi_1 {}^{SG} \sim_G \Psi_1, \dots, \Phi_n {}^{SG} \sim_G \Psi_n$, то $\Phi {}^{SG} \sim_G \Phi'$.

Для відношення $J\models_G$ виконуються властивості декомпозиції формул (див. [10]):

$$A \vee B \models_J \Phi \Leftrightarrow A \models_J \Phi \text{ та } B \models_J \Phi; D \models_J \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow D \models_J \neg P \text{ та } D \models_J \neg Q.$$

Звідси випливають аналогічні властивості для відношень логічного наслідку $|=_G$ та ${}^{SG}|=_G$.

Опишемо умови гарантованої наявності логічного наслідку для відношень $|=_G$ та ${}^{SG}|=_G$.

Теорема 7. Для довільних формул Φ, A, B маємо $\Phi \& A |=_G \Phi \vee B$ та $\Phi \& A {}^{SG}|=_G \Phi \vee B$.

Теорема 8. Для довільних формул Φ, Ψ маємо $\Phi \& \neg \Phi {}^{SG}|=_G \Psi \vee \neg \Psi$.

Для кожного SG -предиката P маємо $T(P) \cap F(P) = \emptyset$. Тому для довільних формул Φ, Ψ та $J \in SG$ маємо $T(\Phi \& \neg \Phi_J) \subseteq T(\Psi \vee \neg \Psi_J)$ та $F(\Psi \vee \neg \Psi_J) \subseteq F(\Phi \& \neg \Phi_J)$. \perp -умова для $\Phi \& \neg \Phi \models_J \Psi \vee \neg \Psi$ виконується гарантовано:

$$\begin{aligned}\perp(\Phi \& \neg \Phi_J) &\subseteq \perp(\Psi \vee \neg \Psi_J) \cup T(\Psi \vee \neg \Psi_J) = \perp(\Psi_J) \cup T(\Psi_J) \cup F(\Psi_J) = {}^V A \\ \perp(\Psi \vee \neg \Psi_J) &\subseteq \perp(\Phi \& \neg \Phi_J) \cup F(\Phi \& \neg \Phi_J) = \perp(\Phi_J) \cup F(\Phi_P_J) \cup T(\Phi_J) = {}^V A.\end{aligned}$$

5. Відношення логічного наслідку для множин формул

Нехай $\Gamma \subseteq Fr$, $\Delta \subseteq Fr$. Введемо позначення $\bigcap_{\Phi \in \Gamma} T(\Phi_J)$ як $T^\wedge(\Gamma_J)$, $\bigcap_{\Psi \in \Delta} F(\Psi_J)$ як $F^\wedge(\Delta_J)$, $\bigcup_{\Psi \in \Delta} T(\Psi_J)$ як $T^\vee(\Delta_J)$, $\bigcup_{\Phi \in \Gamma} F(\Phi_J)$ як $F^\vee(\Gamma_J)$, $\bigcup_{\substack{\alpha_i - \text{це } T \text{ чи } \perp, \\ \text{хоч одне } \alpha_i - \text{це } \perp}} \bigcap_{\Phi_i \in \Gamma} \alpha_i((\Phi_i)_J)$ як $\perp^\wedge(\Gamma_J)$, $\bigcup_{\substack{\beta_i - \text{це } F \text{ чи } \perp, \\ \text{хоч одне } \beta_i - \text{це } \perp}} \bigcap_{\Psi_i \in \Delta} \beta_i((\Psi_i)_J)$ як $\perp^\vee(\Delta_J)$.

Замість $\{\Gamma, \Phi\}_J$ будемо також скорочено писати Γ, Φ_J .

Умова (G) та твердження 5 і 6 стосовно множин формул узагальнюється так.

Твердження 11 (умова G_S). Нехай формули множини Γ трактуємо як поєднані кон'юнкцією, а формули множини Δ – як поєднані диз'юнкцією. Тоді $T^\wedge(\Gamma_J) \cup F^\vee(\Gamma_J) \cup \perp^\wedge(\Gamma_J) = {}^V A$ та $T^\vee(\Delta_J) \cup F^\wedge(\Delta_J) \cup \perp^\vee(\Delta_J) = {}^V A$.

Твердження 12. Нехай формули множини $\{\Gamma, \Phi\}$ трактуємо як поєднані кон'юнкцією, а формули множини $\{\Delta, \Psi\}$ – як поєднані диз'юнкцією. Тоді:

$$\begin{array}{ll} - T^\wedge(\Gamma, \Phi_J) = T_\Gamma \cap T_\Phi; & T^\vee(\Delta, \Psi_J) = T_\Delta \cup T_\Psi; \\ - \perp^\wedge(\Gamma, \Phi_J) = (\perp_\Gamma \cap \perp_\Phi) \cup (T_\Gamma \cap \perp_\Phi) \cup (\perp_\Gamma \cap T_\Phi); & \perp^\vee(\Delta, \Psi_J) = (\perp_\Delta \cap \perp_\Psi) \cup (F_\Delta \cap \perp_\Psi) \cup (\perp_\Delta \cap F_\Psi); \\ - \perp^\vee(\Delta, \Psi_J) \cup T^\wedge(\Delta, \Psi_J) = \perp_\Delta \cup T_\Delta \cup \perp_\Psi \cup T_\Psi; & \perp^\vee(\Delta, \Psi_J) \cup F^\wedge(\Delta, \Psi_J) = (\perp_\Delta \cup F_\Delta) \cap (\perp_\Psi \cup F_\Psi); \\ - \perp^\wedge(\Gamma, \Phi_J) \cup T^\wedge(\Gamma, \Phi_J) = (\perp_\Gamma \cup T_\Gamma) \cap (\perp_\Phi \cup T_\Phi); & \perp^\wedge(\Gamma, \Phi_J) \cup F^\vee(\Gamma, \Phi_J) = \perp_\Gamma \cup F_\Gamma \cup \perp_\Phi \cup F_\Phi. \end{array}$$

Тут і далі будемо позначати $T^\wedge(\Gamma_J)$ як T_Γ , $T^\vee(\Delta_J)$ як T_Δ , $F^\vee(\Gamma_J)$ як F_Γ , $F^\wedge(\Delta_J)$ як F_Δ , $\perp^\wedge(\Gamma_J)$ як \perp_Γ , $\perp^\vee(\Delta_J)$ як \perp_Δ ; для формул вводимо позначення $T(\Psi_J)$ як T_Ψ , $F(\Psi_J)$ як F_Ψ , $\perp(\Psi_J)$ як \perp_Ψ (інтерпретацію J вважаємо зафікованою).

Теорема 9. 1) $\perp^\vee(\Delta_J) \cup T^\vee(\Delta_J) = \bigcup_{\Psi \in \Delta} T(\Psi_J) \cup \bigcup_{\Psi \in \Delta} \perp(\Psi_J)$; 2) $\perp^\wedge(\Delta_J) \cup F^\vee(\Delta_J) = \bigcup_{\Psi \in \Delta} F(\Psi_J) \cup \bigcup_{\Psi \in \Delta} \perp(\Psi_J)$.

Теорема доводиться індукцією за кількістю формул множини Δ .

$\Delta \in G$ -наслідком Γ при J (позн. $\Gamma_J \models_G \Delta$), якщо:

$$T^\wedge(\Gamma_J) \subseteq T^\vee(\Delta_J), \quad F^\wedge(\Delta_J) \subseteq F^\vee(\Gamma_J), \quad \perp^\wedge(\Gamma_J) \subseteq \perp^\vee(\Delta_J) \cup T^\vee(\Delta_J), \quad \perp^\vee(\Delta_J) \subseteq \perp^\wedge(\Gamma_J) \cup F^\vee(\Gamma_J).$$

Відношення логічного наслідку \models_G та \models^{SG}_G для множин формул визначаємо так:

$$\Gamma \models_G \Delta, \text{ якщо } \Gamma_J \models_G \Delta \text{ для кожної інтерпретації } J; \quad \Gamma \models^{SG}_G \Delta, \text{ якщо } \Gamma_J \models_G \Delta \text{ для кожної } J \in SG.$$

Теорема 10. Відношення \models_G , \models^{SG}_G для множин формул рефлексивні: $\Gamma_J \models_G \Gamma$, $\Gamma \models_G \Gamma$, $\Gamma \models^{SG}_G \Gamma$.

Теорема 11. Відношення \models_G для множин формул монотонне: $\Gamma_J \models_G \Delta \Rightarrow \Gamma, \Phi_J \models_G \Delta, \Psi$.

Для перевірки умов для \perp -областей використовуємо твердження 12.

Наслідок 1. Відношення \models_G та \models^{SG}_G монотонні: $\Gamma \models_G \Delta \Rightarrow \Gamma, \Phi \models_G \Delta, \Psi$; $\Gamma \models^{SG}_G \Delta \Rightarrow \Gamma, \Phi \models^{SG}_G \Delta, \Psi$.

Теорема 12. $\Gamma_J \models_G \Delta \vee \Phi$ та $\Phi_J \sim_G \Psi \Rightarrow \Gamma_J \models_G \Delta \vee \Psi$; $\Gamma \& \Phi_J \models_G \Delta$ та $\Phi_J \sim_G \Psi \Rightarrow \Gamma \& \Psi \models_G \Delta$.

Наслідок 2 (теорема заміни еквівалентних для відношень \models_G та \models^{SG}_G).

$$1) \Gamma \models_G \Delta, \Phi \text{ та } \Phi \sim_G \Psi \Rightarrow \Gamma \models_G \Delta, \Psi; \quad \Gamma, \Phi \models_G \Delta \text{ та } \Phi \sim_G \Psi \Rightarrow \Gamma, \Psi \models_G \Delta.$$

$$2) \Gamma \models^{SG}_G \Delta, \Phi \text{ та } \Phi \models^{SG}_G \Psi \Rightarrow \Gamma \models^{SG}_G \Delta, \Psi; \quad \Gamma, \Phi \models^{SG}_G \Delta \text{ та } \Phi \models^{SG}_G \Psi \Rightarrow \Gamma, \Psi \models^{SG}_G \Delta.$$

Теорема 13 (гарантована наявність \models_G). $\Gamma, \Phi \models_G \Delta, \Psi$.

Наслідок 3. Для довільних $\Gamma, \Delta \subseteq Fr$ та $\Phi \in Fr$ маємо: $\Gamma, \Phi \models_G \Delta, \Phi$; $\Gamma, \Phi^{SG} \models_G \Delta, \Phi$.

Таким чином, наявність відношення \models гарантує наступна властивість (тут $\models = \models_G$ або $\models^{SG} \models_{TF}$):

$$C) \Phi, \Gamma \models \Delta, \Phi.$$

Наявність відношення логічного наслідку \models_{TF} логіки R -предикатів теж гарантує [3, 6] властивість C .

Теорема 14. Для довільних $\Gamma, \Delta \subseteq Fr$ та $\Phi, \Psi \in Fr$ маємо: $\Gamma, \Phi, \neg\Phi \models^{SG} \Delta, \Psi, \neg\Psi$.

Таким чином, наявність відношення $\models^{SG} \models_G$ додатково гарантує така властивість:

$$CLR) \Phi, \neg\Phi, \Gamma \models^{SG} \Delta, \Psi, \neg\Psi.$$

Властивість CLR також гарантує [3, 6] наявність відношення \models_{TF} логіки P -предикатів.

Для відношень \models_G та $\models^{SG} \models_G$ для множин формул, маємо властивості еквівалентних перетворень. Це властивості спрощення зовнішньої реномінації та властивості згортки реномінацій і пронесення реномінації через логічні зв'язки та квантори. Ці властивості базуються на відповідних властивостях композицій GND -предикатів: R, RI, RU (властивості спрощення); $RR, R\neg, R\vee, R\exists s, R\exists$. Кожна з них продукує (при цьому використовується теорема заміни еквівалентних) 4 відповідні властивості для відношення логічного наслідку для множин формул, коли виділена формула чи її заперечення знаходиться у лівій чи правій частині цього відношення.

Властивості еквівалентних перетворень для відношень \models_G та $\models^{SG} \models_G$ аналогічні відповідним властивостям для відношення \models_{TF} (див. [6]). Наведемо для прикладу властивості, індуковані $R\vee$ ($\models = \models_G$ чи $\models^{SG} \models_{TF}$).

$$R\vee_L) R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi \vee \Psi), \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi) \vee R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Psi), \Gamma \models \Delta;$$

$$R\vee_R) \Gamma \models R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi \vee \Psi), \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi) \vee R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Psi), \Delta;$$

$$\neg R\vee_L) \neg R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi \vee \Psi), \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \neg(R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi) \vee R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Psi)), \Gamma \models \Delta;$$

$$\neg R\vee_R) \Gamma \models \neg R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi \vee \Psi), \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models \neg(R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Phi) \vee R_{\bar{x}}^{\bar{v}}(\Psi)), \Delta.$$

Опишемо властивості декомпозиції формул для відношень логічного наслідку для множин формул.

Твердження 13. $\neg\neg\Phi, \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow \Phi, \Gamma \models_G \Delta; \Gamma \models_G \neg\neg\Phi, \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models_G \Phi, \Delta$.

Наслідок 4. $\neg\neg\Phi, \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \Phi, \Gamma \models \Delta; \Gamma \models \neg\neg\Phi, \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models \Phi, \Delta$ (тут $\models = \models_G$ чи $\models^{SG} \models_{TF}$).

Твердження 14. $\Gamma \models_G \Phi \vee \Psi, \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models_G \Phi, \Psi, \Delta; \neg\Phi \& \neg\Psi, \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow \neg\Phi, \neg\Psi, \Gamma \models_G \Delta$.

Для кожної інтерпретації J маємо $\neg(\Phi \vee \Psi)_J = (\neg\Phi \& \neg\Psi)_J$. Звідси:

Твердження 15. $\neg(\Phi \vee \Psi), \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow \neg\Phi \& \neg\Psi, \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow \neg\Phi, \neg\Psi, \Gamma \models_G \Delta$.

Наслідок 5. $\Gamma \models \Phi \vee \Psi, \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models \Phi, \Psi, \Delta; \neg(\Phi \vee \Psi), \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \neg\Phi, \neg\Psi, \Gamma \models \Delta$ ($\models = \models_G$ чи $\models^{SG} \models_{TF}$).

Теорема 15. $\Phi \vee \Psi, \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow \Phi, \Gamma \models_G \Delta$ та $\Psi, \Gamma \models_G \Delta$;

$\Gamma \models_G \neg(\Phi \vee \Psi), \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models_G \neg\Phi, \Delta$ та $\Gamma \models_G \neg\Psi, \Delta$.

При доведенні теореми 15 використовуємо твердження 5 та 12.

Наслідок 6. $\Gamma, \Phi \vee \Psi \models \Delta \Leftrightarrow \Gamma, \Phi \models_G \Delta$ та $\Gamma, \Psi \models_G \Delta$;

$\Gamma \models \neg(\Phi \vee \Psi), \Delta \Leftrightarrow \Gamma \models \neg\Phi, \Delta$ та $\Gamma \models \neg\Psi, \Delta$ (тут $\models = \models_G$ або $\models^{SG} \models_{TF}$).

Для отримання наслідку 6 із теореми 15 використовуємо такий закон традиційної логіки:

$$\forall J (\alpha(J) \Leftrightarrow \beta(J)) \Rightarrow (\forall J \alpha(J) \Leftrightarrow \forall J \beta(J)) \quad (*)$$

Підсумовуючи, маємо такі властивості декомпозиції формул (\models – це \models_G чи \models^{SG}_G):

$$\neg\neg_L) \neg\neg\Phi, \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \Phi, \Gamma \models \Delta.$$

$$\neg\neg_R) \Gamma \models \Delta, \neg\neg\Phi \Leftrightarrow \Gamma \models \Delta, \Phi.$$

$$\vee_L) \Phi \vee \Psi, \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \Phi, \Gamma \models \Delta \text{ та } \Psi, \Gamma \models \Delta.$$

$$\vee_R) \Gamma \models \Delta, \Phi \vee \Psi \Leftrightarrow \Gamma \models \Delta, \Phi, \Psi.$$

$$\neg\vee_L) \neg(\Phi \vee \Psi), \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \neg\Phi, \neg\Psi, \Gamma \models \Delta.$$

$$\neg\vee_R) \Gamma \models \Delta, \neg(\Phi \vee \Psi) \Leftrightarrow \Gamma \models \Delta, \neg\Phi \text{ та } \Gamma \models \Delta, \neg\Psi.$$

Таким чином, для відношень \models_G та \models^{SG}_G отримано традиційні властивості декомпозиції формул. Ці властивості ідентичні властивостям декомпозиції для відношень \models_{TF}^R та \models_{TF}^P логіки R -предикатів (див. [6]).

Розглянемо тепер властивості елімінації кванторів.

За монотонністю відношення \models_G (теорема 11) маємо:

$$\textbf{Твердження 16. } E_y, \Gamma \models_G \exists x\Phi, \Delta \Rightarrow E_y, \Gamma \models_G \exists x\Phi, R_y^x\Phi, \Delta; \neg\exists x\Phi, \neg R_y^x\Phi, E_y, \Gamma \models_G \Delta \Rightarrow \neg\exists x\Phi, E_y, \Gamma \models_G \Delta.$$

Зворотні імплікації гарантує

$$\textbf{Теорема 16. } E_y, \Gamma \models_G \exists x\Phi, R_y^x\Phi, \Delta \Rightarrow E_y, \Gamma \models_G \exists x\Phi, \Delta; \neg\exists x\Phi, \neg R_y^x\Phi, E_y, \Gamma \models_G \Delta \Rightarrow \neg\exists x\Phi, E_y, \Gamma \models_G \Delta.$$

Доведення полягає в перевірці виконання відповідних умов для T -областей, F -областей та \perp -областей, які мають виконуватися для цих відношень \models_G . Перевірка умов для T -областей та F -областей така ж, як для відношення \models_{TF} логіки R -предикатів. При перевірці умов для \perp -областей використовуються твердження 5, 7 та 12, а також твердження 8 стосовно предикатів-індикаторів Ey .

$$\textbf{Теорема 17. } \exists x\Phi, \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow R_z^x\Phi, Ez, \Gamma \models_G \Delta, \text{ де } z \in fu(\Phi, \Gamma, \Delta);$$

$$\Gamma \models_G \neg\exists x\Phi, \Delta \Leftrightarrow Ez, \Gamma \models_G \neg R_z^x\Phi, \Delta, \text{ де } z \in fu(\Phi, \Gamma, \Delta).$$

Перевірка відповідних умов для T -областей та F -областей така ж, як для відношення \models_{TF} логіки R -предикатів. При перевірці умов для \perp -областей використовуються твердження 5, 7, 8 та 12.

Згідно (*) із твердження 15 та теорем 16 і 17 маємо властивості елімінації кванторів (\models – це \models_G чи \models^{SG}_G):

$$\exists_L) \exists x\Phi, \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow R_z^x\Phi, Ez, \Gamma \models \Delta, z \in fu(\Phi, \Gamma, \Delta);$$

$$\neg\exists_R) \Gamma \models \neg\exists x\Phi, \Delta \Leftrightarrow Ez, \Gamma \models \neg R_z^x\Phi, \Delta, z \in fu(\Phi, \Gamma, \Delta);$$

$$\exists_{vR}) Ey, \Gamma \models \exists x\Phi, \Delta \Leftrightarrow Ey, \Gamma \models \exists x\Phi, R_y^x\Phi, \Delta;$$

$$\neg\exists_{vL}) \neg\exists x\Phi, Ey, \Gamma \models \Delta \Leftrightarrow \neg\exists x\Phi, \neg R_y^x\Phi, Ey, \Gamma \models \Delta.$$

Вони ідентичні властивостям елімінації кванторів для відношень \models_{TF}^P та \models_{TF}^R логіки R -предикатів [6].

Розглянемо властивості E -розділу та первісного означення. При заданій $J = (A, I)$ вони мають вигляд:

$$IEd) \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow Ey, \Gamma \models_G \Delta \text{ та } \Gamma \models_G \Delta, Ey;$$

$$IEv) \Gamma \models_G \Delta \Leftrightarrow Ez, \Gamma \models_G \Delta \text{ за умови } z \in fu(\Gamma, \Delta).$$

Позначаємо: $T^\wedge(\Gamma_J), T^\vee(\Delta_J), F^\vee(\Gamma_J), F^\wedge(\Delta_J), \perp^\wedge(\Gamma_J), \perp^\vee(\Delta_J)$ як $T_\Gamma, T_\Delta, F_\Gamma, F_\Delta, \perp_\Gamma, \perp_\Delta$; $T(Ey)$ як $y\downarrow$, $F(Ey)$ як $y\uparrow$.

Твердження 17 (випливає з тверджень 8 та 12). $\perp^\wedge(Ey, \Gamma_J) = \perp_\Gamma \cap y\downarrow \subseteq \perp_\Gamma$; $\perp^\vee(Ey, \Delta_J) = \perp_\Delta \cap y\uparrow \subseteq \perp_\Delta$;

$$\perp^\vee(Ey, \Delta_J) \cup T^\vee(Ey, \Delta_J) = \perp_\Delta \cup T_\Delta \cup y\downarrow \supseteq \perp_\Delta \cup T_\Delta; \perp^\wedge(Ey, \Gamma_J) \cup F^\vee(Ey, \Gamma_J) = \perp_\Gamma \cup F_\Gamma \cup y\uparrow \supseteq \perp_\Gamma \cup F_\Gamma.$$

Використовуючи твердження 17, показуємо для \perp -областей в IEd: $\perp_\Gamma \subseteq \perp_\Delta \cup T_\Delta$ та $\perp_\Delta \subseteq \perp_\Gamma \cup F_\Gamma \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \perp^\wedge(Ey, \Gamma_J) \subseteq \perp_\Delta \cup T_\Delta$ та $\perp_\Delta \subseteq \perp^\wedge(Ey, \Gamma_J) \cup F^\vee(Ey, \Gamma_J) = \perp_\Gamma \cup F_\Gamma \cup y^\uparrow$
та $\perp_\Gamma \subseteq \perp^\vee(Ey, \Delta_J) \cup T^\vee(Ey, \Delta_J) = \perp_\Delta \cup T_\Delta \cup y^\downarrow$ та $\perp^\vee(Ey, \Delta_J) \subseteq \perp_\Gamma \cup F_\Gamma$.

Твердження 18. $z \in fu(\Gamma, \Delta)$ та $d \in S \Rightarrow$ для всіх $a \in A$ маємо $d \parallel_{-z} + z \mapsto a \in S$; тут S – це $T_\Gamma, T_\Delta, F_\Gamma, F_\Delta, \perp_\Gamma, \perp_\Delta$.

Використовуючи твердження 17 та 18, показуємо, що за умови $z \in fu(\Gamma, \Delta)$ для \perp -областей в IEv маємо:

$\perp_\Gamma \subseteq \perp_\Delta \cup T_\Delta$ та $\perp_\Delta \subseteq \perp_\Gamma \cup F_\Gamma \Leftrightarrow \perp^\wedge(Ez, \Gamma_J) \subseteq \perp_\Delta \cup T_\Delta$ та $\perp_\Delta \subseteq \perp^\wedge(Ez, \Gamma_J) \cup F^\vee(Ez, \Gamma_J) = \perp_\Gamma \cup F_\Gamma \cup z^\uparrow$.

Згідно (*) із IEd та IEv отримуємо властивості E -розділу та первісного означення ($=$ – це $=_G$ чи $=^{SG}_G$):

Ed) $\Gamma = \Delta \Leftrightarrow Ey, \Gamma = \Delta$ та $\Gamma = \Delta, Ey$.

Ev) $\Gamma = \Delta \Leftrightarrow Ez, \Gamma = \Delta$ за умови $z \in fu(\Gamma, \Delta)$.

Вони ідентичні відповідним властивостям для відношень $=_{TF}$ та $=^P_{TF}$ логіки R -предикатів (див. [6]).

Висновки

Досліджено семантичні аспекти нового класу програмно-орієнтованих логічних формалізмів – логік загальних недетермінованих квазіарних предикатів, або *GND*-предикатів. Ці логіки відображають такі властивості програм, як частковість, недетермінізм, нефіксовану арність. *GND*-предикати є узагальненням відомих часткових неоднозначних предикатів реляційного типу. Виділено низку різновидів *GND*-предикатів, розглянуто властивості їх композицій, описано композиційні алгебри. Показано зв'язок *GND*-предикатів із 7-значними тотальними детермінованими предикатами. Описано мови чистих першопорядкових логік *GND*-предикатів. Досліджено відношення логічного наслідку для множин формул. Визначено відношення *G*-наслідку, логічних *G*-наслідку та *SG*-наслідку, описано їх властивості. Досліджено властивості декомпозиції формул та елімінації кванторів. На цій семантичній основі для логік *GND*-предикатів планується побудова числень секвенційного типу.

Література

1. Handbook of Logic in Computer Science / Edited by S. Abramsky, Dov M. Gabbay and T. S. E. Maibaum. – Oxford University Press, Vol. 1–5, 1993–2000.
2. Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Математична логіка та теорія алгоритмів. Київ: ВПЦ Кіївський університет, 2008. 528 с.
3. Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Прикладна логіка. Київ: ВПЦ Кіївський університет, 2013. 278 с.
4. Nikitchenko M., Shkilniak S. Semantic Properties of Logics of Quasiary Predicates. Workshop on Foundations of Informatics: Proceedings FOI-2015. Chisinau, Moldova. P. 180–197.
5. Шкільняк О.С. Відношення логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів. Проблеми програмування. 2016. № 1. С. 29–43.
6. Нікітченко М.С., Шкільняк О.С., Шкільняк С.С. Чисті першопорядкові логіки квазіарних предикатів. Проблеми програмування. 2016. № 2–3. С. 73–86.
7. Mykola S. Nikitchenko and Stepan S. Shkilniak. Algebras and logics of partial quasiary predicates. Algebra and Discrete Mathematics. Vol. 23 (2017). N 2, P. 263–278.
8. Avron A., Zamansky A. Non-deterministic semantics for logical systems, in Handbook of Philosophical Logic, D.M. Gabbay, F. Guenther (eds.), 2nd ed., Vol. 16, (2011), Springer Netherlands, P. 227–304.
9. Nikitchenko M.S., Shkilniak O.S. and Shkilniak S.S. Logics of partial non-deterministic predicates. PDMU-2017: international conference: abstracts. – Vilnius, Lithuania. P. 94–95.
10. Нікітченко М.С., Шкільняк О.С., Шкільняк С.С. Алгебри загальних недетермінованих предикатів. Проблеми програмування. 2018. № 1. С. 5–21.

References

1. Abramsky S., Gabbay D. and Maibaum T. (editors). (1993–2000). Handbook of Logic in Computer Science. Oxford University Press.
2. Nikitchenko M. and Shkilniak S. (2008). Mathematical logic and theory of algorithms. Kyiv: VPC Kyivskyi Universytet (in ukr).
3. Nikitchenko M. and Shkilniak S. (2013). Applied logic. Kyiv: VPC Kyivskyi Universytet (in ukr).
4. Nikitchenko M. and Shkilniak S. (2015). Semantic Properties of Logics of Quasiary Predicates. In Workshop on Foundations of Informatics: Proceedings FOI-2015. Chisinau, Moldova. P. 180–197.
5. Shkilniak O. (2016). Logical consequence relations in logics of quasiary predicates. In Problems in Programming. № 1. P. 29–43 (in ukr).
6. Nikitchenko M., Shkilniak O. and Shkilniak S. (2016). Pure first-order logics of quasiary predicates. In Problems in Programming. N 2–3. P. 73–86 (in ukr).
7. Nikitchenko M. and Shkilniak S. (2017). Algebras and logics of partial quasiary predicates. In Algebra and Discrete Mathematics. Vol. 23. N 2. P. 263–278.

-
8. Avron A. and Zamansky A. (2011). Non-deterministic semantics for logical systems. In Handbook of Philosophical Logic, D.M. Gabbay, F. Guenther (eds.), 2nd ed., vol. 16, Springer Netherlands. P. 227–304.
 9. Nikitchenko M., Shkilniak O. and Shkilniak S. (2017). Logics of partial non-deterministic predicates. In International conference PDMU-2017: abstracts. Vilnius, Lithuania. P. 94–95.
 10. Nikitchenko M., Shkilniak O. and Shkilniak S. (2018). Algebras of general non-deterministic predicates. In Problems in Programming. N 1. P. 5–21 (in ukr.).

Про авторів:

Нікітченко Микола Степанович,

доктор фізико-математичних наук, професор,

завідувач кафедри Теорії та технології програмування.

Кількість наукових публікацій в українських виданнях – понад 250,

у тому числі у фахових виданнях – понад 110.

Кількість наукових публікацій в зарубіжних виданнях – понад 50.

Scopus Author ID: 6602842336.

H-індекс (Google Scholar): 12 (9 з 2013).

<http://orcid.org/0000-0002-4078-1062>,

Шкільняк Оксана Степанівна,

кандидат фізико-математичних наук,

доцент, доцент кафедри інформаційних систем.

Кількість наукових публікацій в українських виданнях – 90,

у тому числі у фахових виданнях – 34.

Кількість наукових публікацій в зарубіжних виданнях – 10.

Scopus Author ID: 57190873266.

H-індекс (Google Scholar): 3 (3 з 2013).

<http://orcid.org/0000-0003-4139-2525>,

Шкільняк Степан Степанович,

доктор фізико-математичних наук, професор,

професор кафедри Теорії та технології програмування.

Кількість наукових публікацій в українських виданнях – понад 230,

у тому числі у фахових виданнях – понад 100.

Кількість наукових публікацій в зарубіжних виданнях – 17.

Scopus Author ID: 36646762300

H-індекс (Google Scholar): 6 (5 з 2013).

<http://orcid.org/0000-0001-8624-5778>.

Місце роботи авторів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01601, Київ, вул. Володимирська, 60.

Тел.: (044) 259 05 19.

E-mail: me.oksana@gmail.com,

nikitchenko@unicyb.kiev.ua,

sssh@unicyb.kiev.ua.