

除草剤

モーティブ[®] 乳剤

[®]=BASF社の登録商標

除草剤分類 **15,3**

有効成分

ジメテナミドP 19.7%
 ペンディメタリン(PRTR・1種) 23.1%
 有機溶剤、界面活性剤等 57.2%
 (ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム塩
 (PRTR・1種) 2.5%(代表値))

登録番号：第23000号

性 状：暗褐色可乳化
 油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：三石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年(500ml)
 3年(5ℓ)

包 装：500ml×20本
 5ℓ×4本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

- 広範囲の畑地一年生雑草に有効。

フィールドスターPとゴーゴーサンとの混合により広い範囲の雑草に有効です。

- 持続効果に優れる。

土壌処理で長期間にわたり効果が持続します。

- 処理時期にゆとり。

土壌処理剤ですが、とうもろこしのは種後から2葉期まで散布でき、処理時期にゆとりがあります。

■適用雑草と使用方法

(2024年3月27日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
とうもろこし	一年生雑草	は種後～とうもろこし 2葉期(イネ科雑草2葉期まで)	200～ 400ml /10a	100～	1回	全面 土壌 散布
飼料用とうもろこし				150ℓ /10a		
たまねぎ		定植前(雑草発生前)		100ℓ /10a		
		定植後(雑草発生前)但し、 定植45日後まで		100ℓ /10a		
ばれいしょ		植付後萌芽前(雑草発生前)		70～ 150ℓ /10a		
かのこそう		定植後(雑草発生前)但し、 収穫90日前まで		300ml /10a		
だいず えだまめ	は種後出芽前(雑草発生前)	150～ 170ml /10a	70～ 150ℓ /10a			

ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
1回	1回

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 砂土では使用しないでください。
- 雑草の生育が進むと効果が劣るので、必ず時期を失しないように散布してください。
- 散布直後の多量の降雨は薬害のおそれがあるので、天候を見きわめてから散布してください。
- 砕土、整地はていねいに行い、種子が露出しないように覆土はできるだけていねいに行い、覆土深を2～3cm以上にしてください。
- 本剤はとうもろこしのマルチ栽培では薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- たまねぎの定植前に使用する場合には、初期に生育抑制を生じることがあるので散布むらを生じないように均一に散布してください。
- 散布に当たっては、他作物に飛散しないよう十分注意して使用してください。
- 本剤は衣服や自動車、壁などの塗装面に散布液や原液がかかると変色するおそれがあるので、かからないよう注意してください。
- 散布に使った器具類は良く水洗いして、他の用途に使用する時は影響のないように注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けてください。本剤使用中に身体に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。
- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください(刺激性)。
- 散布時は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに、衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性…使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼な所に保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

